# Мікробіологічні середовища



GRASO® BIOTECH

Graso це приватна компанія, розташована в екологічно чистій сільській місцевості, в 50 км від міста Гданська (Північна Польща). Компанія була створена Зеноном та Гражиною Собєцькими у березні 1989 року. З часом це перетворилося з невеликого сімейного бізнесу на середнього розміру підприємство, що діє на різних ринках Польщі.

Graso Biotech - це молодший підрозділ компанії, що спеціалізується на мікробіології. Завдяки своєму активному розвитку, Graso Biotech в даний час є найбільшим виробником готових поживних середовищ у Центральній Європі.

Контроль виробництва та контроль якості здійснюється працівниками компанії відповідно до останніх протоколів ISO 9001 та ISO 13485. Площа 2500 кв.м. використовується як контрольоване середовище (чиста зона) і оснащена обладнанням та інструментами найвищої якості. Виробничий процес проходить у відповідності до сучасних технологій. Повністю автоматизовані лінії гарантують повну простежуваність від сировини до готового продукту.

В даний час наша пропозиція включає в себе понад 400 типів поживних середовищ, розлитих у чашки Петрі, пляшки або пробірки. Також ми можемо приготувати інші поживні середовища відповідно до формул, наданих замовником. Окрім виробництва продуктів, призначених для кінцевих споживачів, як у Польщі, так і за кордоном, Graso Biotech також створює сухі поживні середовища для виробників, які не мають кінцевих ліній.

## Наша місія

Ми допомагаємо лабораторіям адаптуватися до коливань вимог ринку, надаючи їм повний спектр якісних продуктів за конкурентоспроможними цінами.

## Незалежна професійна пропозиція

Як експерти в області in vitro діагностики, ми можемо вибрати найбільш оптимальні формули для забезпечення найкращих параметрів наших готових до використання поживних середовищ. Оптимальний склад гарантує швидкий ріст та точну ідентифікацію мікроорганізмів.

## Продукт з урахуванням Ваших потреб

Ми допомагаємо як провідним лабораторіям, так і більш спеціалізованим підрозділам досліджень та розробок. Окрім стандартної продукції, ми пропонуємо (на замовлення) спеціальні поживні середовища, розроблені з урахуванням потреб Клієнта. З такої точки зору ми можемо відповідати вимогам найвимогливіших клієнтів.

## Навігація за допомогою продажів

Ми залишаємося максимально наближеними до наших Клієнтів, ми створили мережу представників збуту, яка збирає інформацію щодо запитів, тенденцій та проблем, що виникають у сфері мікробіології. Такий зворотній зв'язок допомагає нашій продукції постійно відповідати основним потребам наших Клієнтів.

# Трохи історії...

Спочатку методи культивування мікроорганізмів проводились на основі бульйонів свіжої сироватки яловичини або екстрактів м'яса, що призводило до численних труднощів при виділенні чистих культур. У 1872 році німецький ботанік Джозеф Шретер зумів виділити бактерії на твердому середовищі. Для того, щоб розрізняти колонії, він пасажував забарвлені бактерії на приготованих скибочках картоплі, коагульованому яєчному білку або крохмалі.(1) У 1881 році під час наукової конференції в Лондоні німецький лікар Роберт Кох представив нову техніку культивування. Тобто "інновація", яка включала збагачення бульйону желатином, після чого її виливали на плоскі скляні пластини, була в той час знайома мікологам. Незважаючи на те, що так званий "живильний желатин" був великим кроком вперед, він був ще далеким від методу, вільного від перешкод. Наприклад, желатинізовані середовища стають рідкими при температурі, яка трохи перевищує кімнатну температуру, що призвело до труднощів і гальмування росту більшості збудників хвороб. Через рік Уолтер Хессе під час свого наукового обміну в лабораторії Коха зміг замінити желатин агаром. Власне, це була ідея його дружини - Фанні, яка з радістю брала участь у дослідженнях чоловіка. Вона використовувала агар для приготування фруктових желе. Сімейний рецепт вона отримала від своїх голландських друзів, які ознайомилися з кулінарним використанням агару на острові Ява.(2) На відміну від желатину, агар не плавиться при 37 ° С і рідко розщеплюється бактеріями. Фанні була також художником. Її малюнки бактеріальних колоній, які вона бачила через мікроскоп і вишукана акварель зображують різні стадії росту Salmonella typhi та ілюструють дослідження Уолтера Хессе у опублікованих роботах. Через шість років Джуліус Петрі, інший працівник лабораторії Коха, змінив посуд, що використовувався для агаризованих середовищ.

Щоб уникнути забруднення, він розробив пласку кришку, що покриває чашку, яка замінила громіздкі дзвоникоподібні. Ось так були винайдені чашки Петрі.(3) Ця зміна методу культивування вплинула на розробку нових рецептів поживних середовищ. З них понад 2,5 тисяч описані в монографії Макса Левіні та Анрі Шенле, опублікованій в 1930 році!(4) У Англії до 1930-х років поживні середовища готувались кожною лабораторією окремо для власного використання. Постійний розвиток лікарняних служб лондонського округу призвів до розвитку, на сьогоднішній день, мережі лабораторій, яка надихнула британського бактеріолога Джеймса МакКартні на створення централізованої "кухні" поживних середовищ.(5) Доктор МакКартні також представив гвинтові засоби, закриті пляшки для готових до використання з поживних середовищ.(6) Лише після Другої світової війни введено в експлуатацію дегідратовані поживні середовища, з якими ми сьогодні знайомі.

1. Hitchens, A. P. & Leikind, M. C. The Introduction of Agar-agar into Bacteriology. J Bacteriol, 37(5), 485-493 (1939).
2. Hesse, W. Walther & Angelina Hesse-Early Contributors to Bacteriology. ASM News 58, 425-428 (1992).
3. Petri, R. J. Eine kleine Modification des Koch'schen Plattenverfahrens. Centralbl. F. Bakteriol., 1, 279-280 (1887).
4. Levine, M. and Schoenlein, H. W. A compilation of culture media for the cultivation of microorganisms. Baltimore, The Williams & Wilkins Company, Baltimore USA (1930)
5. Collard, P. The development of microbiology. Cambridge University Press: New York (1976).
6. McCartney, J. E., 1933, Screw-capped bottles in the preparation and storage of culture media. Lancet, 2, 433 (1993).

## Технічна підтримка




Департамент обслуговування клієнтів складається з фахівців з біотехнології та мікробіології, які завжди до ваших послуг, або по телефону, або через e-mail: ye.gushchyn@medcoswiss.com.ua

## Свіжоприготовані продукти найвищої якості

Завдяки нашій системі безперервного збору замовлень, наш Клієнт отримує свіжоприготований продукт, що пройшов контроль якості.

## Прямі продажі - Швидка доставка

Завдяки нашій власній дистриб'юторській мережі відразу після проходження виробничої лінії та процедур контролю якості наші поживні середовища надсилаються безпосередньо клієнтові.

www.medcoswiss.com.ua

**Замовлення приймаються до кожного 5 числа місяця, та поставляються на протязі 30 днів.**
**Термін придатності середовищ на момент поставки є не меншим ніж 30 днів.**
**Питання стовно продукції:**

graso@medcoswiss.com.ua
ye.gushchyn@medcoswiss.co
**+38 (067) 217 87 50**
**Євген Гущин**

**наявна медична декларація**

| Група товарів | Код | Назва | Призначення | Фасування | Одиниця | Ціна (Євро), з ПДВ | Ціна (Євро), без ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кров та сироватка | 1000BT100 | КРОВ БАРАНЯЧА ДЕФІБРИНОВАНА | кров | 100 | мл | 14,57 | 13,62 |
| Кров та сироватка | 1000BT200 | КРОВ БАРАНЯЧА ДЕФІБРИНОВАНА | кров | 200 | мл | 29,14 | 27,23 |
| Кров та сироватка | 1000BT50 | КРОВ БАРАНЯЧА ДЕФІБРИНОВАНА | кров | 50 | мл | 7,29 | 6,81 |
| Кров та сироватка | 1002BT100 | КРОВ КОНЯЧА ДЕФІБРИНОВАНА | кров | 100 | мл | 35,43 | 33,11 |
| Кров та сироватка | 1002BT50 | КРОВ КІНСЬКА ДЕФІБРИНОВАНА | кров | 50 | мл | 17,72 | 16,56 |
| Кров та сироватка | 1004BT100 | СИРОВАТКА КОНЯЧА | сироватка | 100 | мл | 39,37 | 36,79 |
| Кров та сироватка | 1004BT50 | СИРОВАТКА КОНЯЧА | сироватка | 50 | мл | 19,69 | 18,40 |
| Культуральні бульйони | 5001VL50 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ АЕРОБНИХ БАКТЕРІЙ | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 50 | мл | 6,30 | 5,89 |
| Культуральні бульйони | 5002VL15 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ АЕРОБНИХ БАКТЕРІЙ (ПЕДІАТРИЧНЕ) | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 15 | мл | 5,47 | 5,11 |
| Культуральні бульйони | 5003VL5 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ АЕРОБНИХ БАКТЕРІЙ (ПЕДІАТРИЧНЕ) | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 5 | мл | 4,62 | 4,32 |
| Культуральні бульйони | 5004VL50 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ АНАЕРОБНИХ БАКТЕРІЙ | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 50 | мл | 6,30 | 5,89 |
| Культуральні бульйони | 5006VL5 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ АНАЕРОБНИХ БАКТЕРІЙ (ПЕДІАТРИЧНЕ) | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 5 | мл | 4,62 | 4,32 |
| Культуральні бульйони | 5007VL5 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ З РІДИНИ СПИННОМОЗКОВОЇ (ПЕДІАТРИЧНЕ) | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 5 | мл | 5,23 | 4,89 |
| Культуральні бульйони | 5008VL15 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ З РІДИНИ СПИННОМОЗКОВОЇ (ПЕДІАТРИЧНЕ) | Культуральні бульйони для крові та церебро-спинальної рідини | 15 | мл | 5,89 | 5,50 |
| Сухе середовище | 0119DM500 | АГАР БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ | Середовище збагачення | 500 | г | 101,71 | 84,76 |
| Сухе середовище | 0284DM500 | АГАР З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ БЕЗ ГЛЮКОЗИ | Середовище збагачення | 500 | г | 87,10 | 72,58 |
| Сухе середовище | 0131DM500 | ОСНОВА АГАРУ БАЙРД ПАРКЕРА | Staphylococcus aureus | 500 | г | 84,46 | 78,93 |
| Сухе середовище | 0106DM500 | АГАР З СЕРЦЕВО-МОЗКОВИМ ЕКСТРАКТОМ (BHI AGAR) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 500 | г | 85,02 | 79,46 |
| Сухе середовище | 0105DM500 | БУЛЬЙОН З СЕРЦЕВО-МОЗКОВИМ ЕКСТРАКТОМ (BHI BROTH) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 500 | г | 70,86 | 66,22 |
| Сухе середовище | 0102DM500 | ВІСМУТ-СУЛЬФІТНИЙ АГАР (WILSON BLAIR) | Salmonella | 500 | г | 137,74 | 114,78 |
| Сухе середовище | 0103DM500 | ОСНОВА КРОВ'ЯНОГО АГАРУ | Середовище збагачення | 500 | г | 65,18 | 60,92 |
| Сухе середовище | 0209DM500 | АГАР З ДІАМАНТОВИМ ЗЕЛЕНИМ МОДИФІКОВАНИЙ (BGA) | Salmonella | 500 | г | 119,20 | 99,33 |
| Сухе середовище | 9017DM500 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl з ПЕПТОНОМ з РН 7,0 | розчини | 500 | г | 63,58 | 52,98 |
| Сухе середовище | 0126DM500 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 500 | г | 99,48 | 92,97 |
| Сухе середовище | 9001DM500 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 500 | г | 105,99 | 99,06 |
| Сухе середовище | 0111DM500 | ЦИСТИН-ЛАКТОЗА-ЕЛЕКТРОЛІТ-ДЕФІЦИТНИЙ АГАР (CLED AGAR) (Для диференціювання та підрахунку мікроорганізмів в сечі) | мікроорганізми в сечі | 500 | г | 70,86 | 66,22 |
| Сухе середовище | 0107DM500 | КОЛУМБІЯ АГАР ОСНОВА | Середовище збагачення | 500 | г | 53,85 | 50,33 |
| Сухе середовище | 0270DM500 | КУКУРУДЗЯНИЙ АГАР (для виявлення червоного пігменту у Trichophyton rubrum та хламідоспор Candida albicans) | Дріжджі/Плісені | 500 | г | 170,04 | 141,70 |
| Сухе середовище | 0183DM500 | ГЛЮКОЗО-ТРИПТОННИЙ АГАР (для виявлення та підрахунку мезофільних і термофільних аеробних мікроорганізмів в продуктах харчування.) | Середовище збагачення | 500 | г | 77,56 | 64,63 |
| Сухе середовище | 0248DM500 | ДИХЛОРАН ГЛІЦЕРОЛ АГАР DG-18 (Для селективного виділення і підрахунку дріжджів і пліснеей вд харчових продуктах) | Дріжджі/Плісені | 500 | г | 82,64 | 68,87 |
| Сухе середовище | 0273DM500 | АГАР З ДИХЛОРАНОМ, БЕНГАЛЬСЬКИМ РОЗОВИМ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ (DRBC AGAR) | Дріжджі/Плісені | 500 | г | 95,35 | 79,46 |
| Сухе середовище | 0125DM500 | ДРІЖДЖЕВИЙ ЕКСТРАКТ | реактиви | 500 | г | 85,28 | 71,07 |
| Сухе середовище | 0134DM500 | СЕРЕДОВИЩЕ ЕНДО (ENDO AGAR) | Enterobacteriaceae | 500 | г | 93,24 | 87,14 |
| Сухе середовище | 0108DM500 | ЖОВЧНО-ЕСКУЛІНОВИЙ АГАР З АЗИДОМ НАТРІЯ (ENTEROCOCCOSEL AGAR) | Enterococcus | 500 | г | 96,36 | 90,06 |
| Сухе середовище | 0146DM500 | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 500 | г | 91,16 | 85,20 |
| Сухе середовище | 0223DM500 | ОСНОВА БУЛЬЙОНУ ФРЕЙЗЕРА | Listeria | 500 | г | 66,74 | 55,62 |
| Сухе середовище | 7626DM500 | Основа половинного бульону Фразера | Listeria | 500 | г | 79,45 | 66,21 |
| Сухе середовище | 0275DM500 | БУЛЬЙОН ЖІОЛІТТІ-КАНТОНІ (для збагачення Staphylococcus aureus з продуктів харчування.) | Staphylococcus aureus | 500 | г | 74,16 | 61,80 |
| Сухе середовище | 0110DM500 | ГЕКТОЕНОВИЙ ЕНТЕРОАГАР (селективний та диференційний агар для виділення сальмонели та шигели з зразків хворого.) | Salmonella | 500 | г | 85,02 | 79,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Сухе середовище** | 0212DM500 | АГАР ДЛЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ (MRS) | Lactic Acid Bacteria | 500 | г | **73,69** | **68,87** |
| **Сухе середовище** | 0104DM500 | АГАР ЛЕВІНА З ЕОЗИНОМ І МЕТИЛЕНОВИМ СИНІМ (LEMB) (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 500 | г | **66,32** | **61,98** |
| **Сухе середовище** | 0265DM500 | ОСНОВА ЖОВЧНОГО АГАРУ З НАТРІЙ-ХЛОРИДОМ (M.Y.P. AGAR) (для підерахунку Bacillus cereus у зразках харчових продуктів) | Bacillus cereus | 500 | г | **106,48** | **88,73** |
| **Сухе середовище** | 0113DM500 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 500 | г | **48,18** | **45,03** |
| **Сухе середовище** | 9003DM500 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 500 | г | **70,25** | **58,54** |
| **Сухе середовище** | 0136DM500 | АГАР МАККОНКІ З СОРБІТОЛОМ (Для виділення патогенної Escherichia coli.) | Escherichia coli | 500 | г | **59,51** | **55,62** |
| **Сухе середовище** | 0219DM500 | МАККОНКІ БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Escherichia coli) | Escherichia coli | 500 | г | **71,80** | **67,10** |
| **Сухе середовище** | 9004DM500 | МАККОНКІ БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Escherichia coli) | Escherichia coli | 500 | г | **111,24** | **92,70** |
| **Сухе середовище** | 0239DM500 | СОЛОДОВИЙ АГАР (WORT AGAR) (Для ізоляції та підрахунку дріжджів.) | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **68,87** | **57,39** |
| **Сухе середовище** | 9005DM500 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ | Staphylococcus aureus | 500 | г | **31,18** | **29,14** |
| **Сухе середовище** | 0115DM500 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (CHAPMAN) | Staphylococcus aureus | 500 | г | **75,57** | **70,63** |
| **Сухе середовище** | 0262DM500 | АГАР ДЛЯ ПІДРАХУНКУ КОЛОНІЙ З МОЛОКОМ (ля виділення і підрахунку мікроорганізмів у молоці та молочних продуктах. | Загальне мікробне забруднення | 500 | г | **148,32** | **123,60** |
| **Сухе середовище** | 9006DM500 | БУЛЬЙОН МОССЕЛЯ (Для селективного збагачення Enterobacteriaceae) | Enterobacteriaceae | 500 | г | **127,14** | **105,95** |
| **Сухе середовище** | 0217DM500 | БУЛЬЙОН МОССЕЛЯ (Для селективного збагачення Enterobacteriaceae) | Enterobacteriaceae | 500 | г | **115,38** | **96,15** |
| **Сухе середовище** | 0195DM500 | ОСНОВА МОДИФІКОВАНОГО НАПІВТВЕРДОГО АГАРУ РАПАПОРТА-ВАСИЛІАДІСА (MSRV) | Salmonella | 500 | г | **52,98** | **44,15** |
| **Сухе середовище** | 0232DM500 | БУЛЬЙОН МЮЛЕР-ХІНТОН (Для селективного збагачення Salmonella.) | Salmonella | 500 | г | **66,13** | **61,80** |
| **Сухе середовище** | 0116DM500 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 500 | г | **54,70** | **51,12** |
| **Сухе середовище** | 0197DM500 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР згідно з EUCAST (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 500 | г | **60,08** | **56,15** |
| **Сухе середовище** | 0282DM500 | ОСНОВА БУЛЬЙОНУ МЮЛЕРА-КАУФМАНА З ТЕТРАТИОНАТОМ (MKKTTn BASE) | Salmonella | 500 | г | **71,33** | **66,66** |
| **Сухе середовище** | 0151DM500 | ПОЖИВНИЙ АГАР 1,5% | Загальне мікробне забруднення | 500 | г | **85,02** | **79,46** |
| **Сухе середовище** | 0236DM500 | ОКСФОРД АГАР ОСНОВА | Listeria | 500 | г | **127,14** | **105,95** |
| **Сухе середовище** | 0230DM500 | АГАР ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІСТЕРІЙ БАЗА | Listeria | 500 | г | **117,07** | **97,56** |
| **Сухе середовище** | 0160DM500 | ПЕПТОН А | реактиви | 500 | г | **81,05** | **67,54** |
| **Сухе середовище** | 0144DM500 | ПЕПТОН С панкреатиновий гідролізат казеїну | реактиви | 500 | г | **68,34** | **56,95** |
| **Сухе середовище** | 0318DM500 | ПЕПТОН С2 папаїновий гідролізат соєвого борошна | реактиви | 500 | г | **84,76** | **70,63** |
| **Сухе середовище** | 9007DM500 | КАРТОПЛЯНО-ГЛЮКОЗНИЙ АГАР | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **101,71** | **84,76** |
| **Сухе середовище** | 9018DM500 | R2 АГАР (Для виділення і підрахунку бактерій в воді.) | Загальне мікробне забруднення | 500 | г | **82,32** | **68,60** |
| **Сухе середовище** | 0155DM500 | БУЛЬЙОН РАПАПОРТА-ВАСИЛІАДІСА | Salmonella | 500 | г | **93,53** | **87,41** |
| **Сухе середовище** | 0175DM500 | РОЗЧИН 0,85% NaCl з ПЕПТОНОМ | розчини | 500 | г | **79,46** | **66,22** |
| **Сухе середовище** | 0117DM500 | АГАР САБУРО з ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **51,96** | **48,56** |
| **Сухе середовище** | 9010DM500 | АГАР САБУРО з ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **42,51** | **39,73** |
| **Сухе середовище** | 0114DM500 | АГАР САБУРО з ДЕКСТРОЗОЮ і ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **52,43** | **49,00** |
| **Сухе середовище** | 0150DM500 | БУЛЬЙОН САБУРО з ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **61,41** | **57,39** |
| **Сухе середовище** | 0120DM500 | АГАР ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ САЛЬМОНЕЛ І ШІГЕЛ (SS агар) | Salmonella | 500 | г | **75,57** | **70,63** |
| **Сухе середовище** | 0138DM500 | ОСНОВА АГАРУ ШЕДЛЕРА | анаеробні мікроорганізми | 500 | г | **94,66** | **88,47** |
| **Сухе середовище** | 0139DM500 | БУЛЬЙОН ШЕДЛЕРА | анаеробні мікроорганізми | 500 | г | **79,35** | **74,16** |
| **Сухе середовище** | 0124DM500 | СЕЛЕНІТ F БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Salmonella spp.) | Salmonella | 500 | г | **58,10** | **54,30** |
| **Сухе середовище** | 0234DM500 | СЛАНЦ-БАРТЛІ АГАР згідно з PN ISO 7899-2 (Для ізолювання та підрахунку Enterococcus spp. У воді методом мембранної фільтрації.) | Enterococcus | 500 | г | **62,35** | **58,27** |
| **Сухе середовище** | 0252DM500 | СТАНДАРТНИЙ АГАР (МІКРОБНЕ ЧИСЛО) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Загальне мікробне забруднення | 500 | г | **84,76** | **70,63** |
| **Сухе середовище** | 0128DM500 | ТІОГЛІКОЛЕВИЙ БУЛЬЙОН (для культивації широкого спектру мікроорганізмів.) | Середовище збагачення | 500 | г | **116,54** | **97,12** |
| **Сухе середовище** | 0140DM500 | БУЛЬЙОН ТОДДА-ХЮІТА (Для вирощування Streptococcus spp. Та інших вибагливих мікроорганізмів.) | Streptococcus | 500 | г | **76,80** | **71,78** |
| **Сухе середовище** | 0121DM500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | г | **79,99** | **66,66** |
| **Сухе середовище** | 9012DM500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | г | **66,12** | **55,10** |
| **Сухе середовище** | 0167DM500 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) з ЛЕЦИТИНОМ & TWEEN 80 (Для ізоляції мікроорганізмів з дезінфікованих поверхонь з четвертичними сполуками амонію.) | Загальне мікробне забруднення | 500 | г | **71,80** | **67,10** |
| **Сухе середовище** | 0122DM500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | г | **63,58** | **52,98** |
| **Сухе середовище** | 9013DM500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | г | **47,90** | **44,77** |
| **Сухе середовище** | 0283DM500 | ТРИПТОЗА-СУЛЬФІТ ЦИКЛОСЕРИНОВИЙ АГАР (TSC) 0,4 g/l (Для виділення і підрахунку Clostridium perfringens з їжі, зразків води та клінічних зразків.) | Clostridium perfringens | 500 | г | **69,92** | **58,27** |
| **Сухе середовище** | 0245DM500 | ГЛЮКОЗО-ЖОВТКОВИЙ АГАР З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Enterobacteriaceae | 500 | г | **63,58** | **52,98** |
| **Сухе середовище** | 0141DM500 | КРИСТАЛВІОЛЕТ НЕЙТРАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ ЖОВЧНО-ЛАКТОЗНИЙ АГАР (VRBL) (Для виділення і підрахунку Коліформ з їжі.) | Coliforms | 500 | г | **66,74** | **55,62** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Сухе середовище** | 0206DM500 | ПЕПТОННА ВОДА | розчини | 500 | г | **57,22** | **47,68** |
| **Сухе середовище** | 0130DM500 | КСИЛОЗО-ЛІЗИНОВИЙ ДЕЗАКСИХОЛАТНИЙ АГАР (XLD AGAR) | Salmonella | 500 | г | **73,69** | **68,87** |
| **Сухе середовище** | 0303DM500 | КСИЛОЗО-ЛІЗИНОВИЙ ДЕЗАКСИХОЛАТНИЙ АГАР згідно з PN ISO 6579 | Salmonella | 500 | г | **82,64** | **68,87** |
| **Сухе середовище** | 0123DM500 | ЄРСІНІЯ CIN АГАР ОСНОВА (YERSINIA CIN AGAR BASE) (для ізоляції та підрахунку Yersinia enterocolitica від клінічних зразків) | Yersinia | 500 | г | **104,89** | **87,41** |
| **Сухе середовище** | 0291DM500 | АГАР З ЕКСТРАКТОМ ДРІЖДЖІВ (YGC AGAR) (для виділення і підрахунку дріжджів і плісеней у молоці та молочних продуктах) | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **55,62** | **46,35** |
| **Сухе середовище** | 0291ADM500 | АГАР З ЕКСТРАКТОМ ДРІЖДЖІВ (YGC AGAR) згідно з PN ISO 7954 (для виділення і підрахунку дріжджів і плісеней у молоці та молочних продуктах) | Дріжджі/Плісені | 500 | г | **55,62** | **46,35** |
| **Сухе середовище** | 0162DM10000 | БУФЕРНА ПЕПТОННА ВОДА | розчини | 10000 | г | **444,96** | **370,80** |
| **Сухе середовище** | 0162DM500 | БУФЕРНА ПЕПТОННА ВОДА | розчини | 500 | г | **50,86** | **42,38** |
| **Сухе середовище** | 0147DM500 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР ОСНОВА (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 500 | г | **74,79** | **69,90** |
| **Сухе середовище** | 0158DM500 | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПТОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 500 | г | **52,51** | **43,76** |
| **Сухе середовище** | 0254DM500 | РР ЧЕРВОНИЙ АГАР (Для диференціювання Enterobacteriaceae на основі рухливості та кольорової реакції.) | Enterobacteriaceae | 500 | г | **122,36** | **101,97** |
| **Сухе середовище** | 0112DM500 | АГАР КЛІГЛЕРА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози та декстрози та виділення сірководню.) | Диференційне середовище | 500 | г | **86,30** | **80,65** |
| **Сухе середовище** | 0127DM500 | ЦИТРАТНИЙ АГАР СІММОНСА (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі утилізації цитрату.) | Диференційне середовище | 500 | г | **81,74** | **76,39** |
| **Сухе середовище** | 0222DM500 | БУЛЬЙОН КЛАРКА (Для диференціювання бактерій за допомогою метилового червоного і Voges-Proskauer реакцій.) | Диференційне середовище | 500 | г | **58,13** | **54,33** |
| **Сухе середовище** | 0133DM500 | Діамантовий зелений жовчний бульон (BGBB) (2%) (Для селективного нагромадження коліформ у зразках води, продуктах харчування та молочних продуктах) | Coliforms | 500 | г | **90,55** | **75,46** |
| **Сухе середовище** | 0287DM500 | АГАР З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ | Середовище збагачення | 500 | г | **58,52** | **48,77** |
| **Середовище у флаконах** | 3117BT100 | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 100 | мл | **3,68** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 8026BT100 | АГАР З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ БЕЗ ГЛЮКОЗИ згідно З PN ISO 6222 | Мікробне забруднення води | 100 | мл | **6,30** | **5,25** |
| **Середовище у флаконах** | 8026BT200 | АГАР З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ БЕЗ ГЛЮКОЗИ згідно З PN ISO 6222 | Мікробне забруднення води | 200 | мл | **9,42** | **7,85** |
| **Середовище у флаконах** | 8026BT500 | АГАР З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ БЕЗ ГЛЮКОЗИ згідно З PN ISO 6222 | Мікробне забруднення води | 500 | мл | **15,72** | **13,10** |
| **Середовище у флаконах** | 8001BT350 | АГАР З ГІДРАЛІЗАТОМ КАЗЕЇНУ І СОЇ (триптон-соєвий агар) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 350 | мл | **9,48** | **7,90** |
| **Середовище у флаконах** | 3048BT200 | АГАР ЗВИЧАЙНИЙ (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **4,42** | **3,68** |
| **Середовище у флаконах** | 3226BT90 | БАЙРД ПАРКЕР АГАР + RPF НАБІР / 90 + 10 ML | Staphylococcus aureus | 90 | мл | **22,96** | **19,13** |
| **Середовище у флаконах** | 3023BT200 | АГАР З СЕРЦЕВО-МОЗКОВИМ ЕКСТРАКТОМ (BHI агар) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 200 | мл | **6,57** | **6,14** |
| **Середовище у флаконах** | 3022BT200 | БУЛЬЙОН З СЕРЦЕВО-МОЗКОВИМ ЕКСТРАКТОМ (BHI бульон) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,78** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3024BT100 | СОЛОДОВИЙ БУЛЬЙОН (для збагачення дріжджів) | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **6,48** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3142ABT90 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН З PH7,0 З ДОДАТКОМ 55G TWEEN 80 | розчини | 90 | мл | **4,72** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3142BT90 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН З PH7,0 З ДОДАТКОМ 1G TWEEN 80 | розчини | 90 | мл | **4,13** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 3142BT100 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН З PH 7,0 + TWEEN 80 | розчини | 100 | мл | **3,83** | **3,19** |
| **Середовище у флаконах** | 3142BT500 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН З PH 7,0 + TWEEN 80 | розчини | 500 | мл | **8,65** | **7,21** |
| **Середовище у флаконах** | 3028BT90 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН З ПЕПТОНОМ І PH 7,0 | розчини | 90 | мл | **3,83** | **3,19** |
| **Середовище у флаконах** | 3074BT100 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 100 | мл | **3,48** | **2,90** |
| **Середовище у флаконах** | 3074BT200 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 200 | мл | **5,24** | **4,37** |
| **Середовище у флаконах** | 3074BT500 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 500 | мл | **8,71** | **7,26** |
| **Середовище у флаконах** | 3167BT100 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,9% NaCl | розчини | 100 | мл | **3,48** | **2,90** |
| **Середовище у флаконах** | 9017BT90 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З PH 7,0 | розчини | 90 | мл | **4,54** | **3,78** |
| **Середовище у флаконах** | 9017BT100 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З PH 7,0 | розчини | 100 | мл | **4,54** | **3,78** |
| **Середовище у флаконах** | 9017BT500 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З PH 7,0 | розчини | 500 | мл | **9,13** | **7,61** |
| **Середовище у флаконах** | 9019BT100 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З PH 7 І TWEEN 80 1g/l | розчини | 100 | мл | **4,54** | **3,78** |
| **Середовище у флаконах** | 9019BT200 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З PH 7 І TWEEN 80 1g/l | розчини | 200 | мл | **6,83** | **5,69** |
| **Середовище у флаконах** | 9019BT500 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З PH 7 І TWEEN 80 1g/l | розчини | 500 | мл | **11,36** | **9,47** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Середовище у флаконах** | 3402BT500 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З pH 7 І TWEEN 80 (0.01%) | розчини | 500 | мл | **11,36** | **9,47** |
| **Середовище у флаконах** | 3168BT100 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl З ПЕПТОНОМ З pH 7 І TWEEN 80 100 g/L | розчини | 100 | мл | **5,89** | **4,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3202BT225 | БУЛЬЙОН БОЛТОНА (Для селективного збагачення Campylobacter spp.) | Campylobacter | 225 | мл | **10,01** | **8,34** |
| **Середовище у флаконах** | 8007BT100 | БУЛЬЙОН МОССЕЛЯ (Для селективного збагачення Enterobacteriaceae) | Enterobacteriaceae | 100 | мл | **6,48** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3118BT200 | БУЛЬЙОН З 1% ГЛЮКОЗИ (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **7,07** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 8000BT100 | БУЛЬЙОН З ГІДРОЛІЗАТОМ КАЗЕЇНУ І СОЇ (триптон-соєвий бульон) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 100 | мл | **4,13** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 3045BT200 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 200 | мл | **9,45** | **8,83** |
| **Середовище у флаконах** | 3045BT500 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 500 | мл | **15,75** | **14,72** |
| **Середовище у флаконах** | 9001BT200 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 200 | мл | **9,45** | **8,83** |
| **Середовище у флаконах** | 3116BT100 | КРІСТЕНСЕН БУЛЬЙОН (Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі продукування уреази.) | Enterobacteriaceae | 100 | мл | **4,46** | **4,17** |
| **Середовище у флаконах** | 3014BT500 | КОЛУМБІЯ АГАР БАЗА (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин. Добавки: кров барана (Ref.No. 1000) | Середовище збагачення | 500 | мл | **5,25** | **4,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3072BT100 | DEY ENGLEY НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ БУЛЬЙОН (Нейтралізуючий бульйон використовується в випробуваннях дезинфектантів, де нейтралізація антисептиків та дезинфікуючих засобів важлива для визначення бактерицидної активності) | Нейтралізатор | 100 | мл | **4,13** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 3072BT200 | DEY ENGLEY НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ БУЛЬЙОН (Нейтралізуючий бульйон використовується в випробуваннях дезинфектантів, де нейтралізація антисептиків та дезинфікуючих засобів важлива для визначення бактерицидної активності) | Нейтралізатор | 200 | мл | **6,18** | **5,15** |
| **Середовище у флаконах** | 3087BT100 | ДИХЛОРАН ГЛІЦЕРОЛ АГАР DG-18 (Для селективного виділення і підрахунку дріжджів і плісеней вд харчових продуктах) | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **4,72** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3087BT200 | ДИХЛОРАН ГЛІЦЕРОЛ АГАР DG-18 (Для селективного виділення і підрахунку дріжджів і плісеней вд харчових продуктах) | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **7,07** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3230BT100 | АГАР З ДИХЛОРАНОМ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ ТА БЕНГАЛЬСЬКИМ РОЖЕВИМ (DRBC) | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **5,12** | **4,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3230BT200 | АГАР З ДИХЛОРАНОМ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ ТА БЕНГАЛЬСЬКИМ РОЖЕВИМ (DRBC) | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **7,66** | **6,38** |
| **Середовище у флаконах** | 3102BT100 | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 100 | мл | **4,23** | **3,95** |
| **Середовище у флаконах** | 3102BT200 | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 200 | мл | **6,36** | **5,94** |
| **Середовище у флаконах** | 3102BT500 | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 500 | мл | **11,02** | **10,30** |
| **Середовище у флаконах** | 3102BT90 | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 90 | мл | **4,74** | **3,95** |
| **Середовище у флаконах** | 3528BT500 | HC АГАР З TWEEN 80 (HC AGAR WITH TWEEN 80) (для підрахунку пліseней в косметологічних продуктах) | Косметологія | 500 | мл | **6,48** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3021BT200 | ГЕКТОЕНОВИЙ ЕНТЕРОАГАР (селективний та диференційний агар для виділення сальмонели та шигели з зразків хворого.) | Enterobacteriaceae | 200 | мл | **11,76** | **10,99** |
| **Середовище у флаконах** | 0004BT500 | СТЕРИЛЬНА ДЕСТИЛЬОВАНА ВОДА | розчини | 500 | мл | **5,30** | **4,42** |
| **Середовище у флаконах** | 3029BT100 | MRS АГАР ДЛЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ | Лактобактерії | 100 | мл | **7,35** | **6,87** |
| **Середовище у флаконах** | 3029BT200 | MRS АГАР ДЛЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ | Лактобактерії | 200 | мл | **11,02** | **10,30** |
| **Середовище у флаконах** | 3017BT200 | МАККОНКІ АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок) | Enterobacteriaceae | 200 | мл | **7,35** | **6,87** |
| **Середовище у флаконах** | 3017BT500 | МАККОНКІ АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок) | Enterobacteriaceae | 500 | мл | **12,34** | **11,53** |
| **Середовище у флаконах** | 9003BT200 | МАККОНКІ АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок) | Грам (-) палички | 200 | мл | **8,24** | **6,87** |
| **Середовище у флаконах** | 9004BT100 | МАККОНКІ БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Escherichia coli) | Escherichia coli | 100 | мл | **5,00** | **4,17** |
| **Середовище у флаконах** | 9004BT200 | МАККОНКІ БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Escherichia coli) | Escherichia coli | 200 | мл | **7,66** | **6,38** |
| **Середовище у флаконах** | 3016BT200 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (для виділення Staphylococcus spp.) | Staphylococcus | 200 | мл | **7,35** | **6,87** |
| **Середовище у флаконах** | 3016BT500 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (для виділення Staphylococcus spp.) | Staphylococcus | 500 | мл | **12,34** | **11,53** |
| **Середовище у флаконах** | 9005BT200 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (для виділення Staphylococcus spp.) | Staphylococcus | 200 | мл | **7,35** | **6,87** |
| **Середовище у флаконах** | 9006BT100 | БУЛЬЙОН МОССЕЛЯ (Для селективного збагачення Enterobacteriaceae) | Enterobacteriaceae | 100 | мл | **6,48** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 9006BT200 | БУЛЬЙОН МОССЕЛЯ (Для селективного збагачення Enterobacteriaceae) | Enterobacteriaceae | 200 | мл | **9,72** | **8,10** |
| **Середовище у флаконах** | 3085BT200 | МОДИФІКОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РАПАПОРТА-ВАССІЛІАДІСА (MSRV) АГАР | Salmonella | 200 | мл | **7,01** | **5,84** |
| **Середовище у флаконах** | 3085BT500 | МОДИФІКОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РАПАПОРТА-ВАССІЛІАДІСА (MSRV) АГАР | Salmonella | 500 | мл | **11,77** | **9,81** |
| **Середовище у флаконах** | 3035BT200 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 200 | мл | **6,30** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3035BT500 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 500 | мл | **10,50** | **9,81** |
| **Середовище у флаконах** | 3503BT500 | РОЗЧИН NaCl 0,45% (пластмасова пляшка) | розчини | 500 | мл | **4,72** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3587BT100 | Нейтралізатор II, згідно з EN 14562:2006 | розчини | 100 | мл | **4,72** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3205BT200 | ЖИВИЛЬНИЙ АГАР 1,5% (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,25** | **4,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3227BT200 | ЖИВИЛЬНИЙ БУЛЬЙОН (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,00** | **4,17** |
| **Середовище у флаконах** | 3415BT200 | ОРАНЖЕВИЙ СИРОВАТКОВИЙ АГАР (OSA) (для виділення і підрахунку псуючих організмів у цитрусових продуктах) | Мікробіологічне забруднення цитрусових | 200 | мл | **7,66** | **6,38** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Середовище у флаконах** | 3666BT100 | РІДИНА НЕЙТРАЛІЗУЮЧА згідно З PN ISO 18593:2005; PN ISO 14562:2006 | Нейтралізатор | 100 | мл | **4,13** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 3518BT500 | СУБСТРАТ НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ З TWEEN 80 20% | Нейтралізатор | 500 | мл | **8,24** | **6,87** |
| **Середовище у флаконах** | 3114BT100 | СУБСТРАТ З МАЛОНАТОМ НАТРІЮ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментування малонату) | Enterobacteriaceae | 100 | мл | **4,21** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 9007BT200 | КАРТОПЛЯНИЙ АГАР З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **7,66** | **6,38** |
| **Середовище у флаконах** | 8046BT100 | АГАР ДЛЯ ПСЕВДОМОНАД CN згідно З PN ISO 12780 ТА PN-EN ISO 16266 | Pseudomonas aeruginosa | 100 | мл | **6,48** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 8046BT200 | АГАР ДЛЯ ПСЕВДОМОНАД CN згідно З PN ISO 12780 ТА PN-EN ISO 16267 | Pseudomonas aeruginosa | 200 | мл | **9,72** | **8,10** |
| **Середовище у флаконах** | 8044BT100 | R2 АГАР (СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГЕТЕРОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПИТНІЙ ВОДІ) | Мікробне забруднення води | 100 | мл | **5,00** | **4,17** |
| **Середовище у флаконах** | 8044BT200 | R2 АГАР (СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГЕТЕРОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПИТНІЙ ВОДІ) | Мікробне забруднення води | 200 | мл | **7,51** | **6,26** |
| **Середовище у флаконах** | 9018BT200 | R2 АГАР (СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГЕТЕРОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПИТНІЙ ВОДІ) | Мікробне забруднення води | 200 | мл | **7,51** | **6,26** |
| **Середовище у флаконах** | 3577BT200 | ПОКРАЩЕНИЙ КЛОСТРИДІАЛЬНИЙ АГАР СЕРЕДНІЙ (RCM) - 15.0g | Clostridium | 200 | мл | **8,83** | **7,36** |
| **Середовище у флаконах** | 3583BT500 | РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 500 | мл | **7,03** | **5,86** |
| **Середовище у флаконах** | 3531BT500 | РОЗЧИН 0,85% NaCl З ПЕПТОНОМ | розчини | 500 | мл | **5,89** | **5,50** |
| **Середовище у флаконах** | 3565BT500 | РОЗЧИН 0,9% NaCl | розчини | 500 | мл | **5,72** | **5,35** |
| **Середовище у флаконах** | 8042BT100 | НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ РОЗЧИН | Нейтралізатор | 100 | мл | **4,13** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 8042BT500 | НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ РОЗЧИН | Нейтралізатор | 500 | мл | **10,31** | **8,59** |
| **Середовище у флаконах** | 3507BT500 | РОЗЧИН SOLI PAGE`A згідно З PN ISO 11731:2002 (виявлення Legionella) | розчини | 500 | мл | **8,65** | **7,21** |
| **Середовище у флаконах** | 3010BT100 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **4,21** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3010BT200 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **6,30** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 9010BT100 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **4,21** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 9010BT200 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **6,30** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 9010BT500 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 500 | мл | **10,50** | **9,81** |
| **Середовище у флаконах** | 3020BT100 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **5,25** | **4,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3020BT200 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **7,88** | **7,36** |
| **Середовище у флаконах** | 3020BT500 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 500 | мл | **13,13** | **12,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3040BT500 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ ТА АКТІДІОНОМ (селективне виділення грибів) | Дріжджі/Плісені | 500 | мл | **14,18** | **13,25** |
| **Середовище у флаконах** | 3050BT100 | БУЛЬЙОН САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **4,21** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3018BT100 | АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ САЛЬМОНЕЛЛ-ШИГЕЛЛ | Salmonella | 100 | мл | **5,78** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3036BT500 | ШЕДЛЕР АГАР БАЗА З ВІТАМІНОМ К (культивування анаеробних мікроорганізмів) | анаеробні мікроорганізми | 500 | мл | **11,02** | **10,30** |
| **Середовище у флаконах** | 3044BT200 | ЦИСТИН-СЕЛЕНІТОВИЙ БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Salmonella з клінічних зразків) | Salmonella | 200 | мл | **7,07** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3037BT200 | СЕЛЕНІТ F БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Salmonella spp.) | Salmonella | 200 | мл | **6,30** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3037BT500 | СЕЛЕНІТ F БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Salmonella spp.) | Salmonella | 500 | мл | **10,45** | **9,77** |
| **Середовище у флаконах** | 3005BT225 | БУЛЬЙОН ФРЕЙЗЕРА ПОЛОВИННОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ згідно з PN ISO 11290 | Listeria | 225 | мл | **7,07** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3401BT100 | СЛАНЕЦЬ-БАРТЛІ АГАР ДЛЯ ЕНТЕРОКОКІВ згідно З PN ISO 7899-2 (Для ізолювання та підрахунку Enterococcus spp. У воді методом мембранної фільтрації) | Enterococcus | 100 | мл | **3,83** | **3,19** |
| **Середовище у флаконах** | 3533BT100 | СТАНДАРТНИЙ АГАР (МІКРОБНЕ ЧИСЛО) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Загальне мікробне забруднення | 100 | мл | **3,54** | **2,95** |
| **Середовище у флаконах** | 3533BT200 | СТАНДАРТНИЙ АГАР (МІКРОБНЕ ЧИСЛО) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Загальне мікробне забруднення | 200 | мл | **5,24** | **4,37** |
| **Середовище у флаконах** | 3522BT200 | ТРИПТОННИЙ АГАР З ЖОВЧЧЮ ТА Х-ГЛЮКОРОНІДОМ (ТВХ) (Для виділення і підрахунку Escherichia coli з їжі та води.) | Escherichia coli | 200 | мл | **10,60** | **8,83** |
| **Середовище у флаконах** | 3038BT100 | ТІОГЛІКОЛЕВИЙ БУЛЬЙОН (для культивації широкого спектру мікроорганізмів.) | Середовище збагачення | 100 | мл | **4,42** | **3,68** |
| **Середовище у флаконах** | 3038BT500 | ТІОГЛІКОЛЕВИЙ БУЛЬЙОН (для культивації широкого спектру мікроорганізмів.) | Середовище збагачення | 500 | мл | **11,04** | **9,20** |
| **Середовище у флаконах** | 3041BT500 | БУЛЬЙОН ТОДДА-ХЮІТА (Для вирощування Streptococcus spp. Та інших вибагливих мікроорганізмів.) | Streptococcus | 500 | мл | **10,50** | **9,81** |
| **Середовище у флаконах** | 3042BT100 | АГАР ДЛЯ ТРИХОМОНАД (Для селективного збагачення Trichomonas vaginalis.) | Trichomonas vaginalis | 100 | мл | **5,25** | **4,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3031BT100 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 100 | мл | **3,68** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 3031BT200 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,78** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3031BT500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | мл | **9,19** | **8,59** |
| **Середовище у флаконах** | 9012BT100 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 100 | мл | **3,68** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 9012BT200 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,78** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 9012BT500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | мл | **9,19** | **8,59** |
| **Середовище у флаконах** | 3098BT200 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР З ЛЕЦИТИНОМ ТА TWEEN 80 | Середовище збагачення | 200 | мл | **7,07** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3032BT100 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 100 | мл | **3,68** | **3,44** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Середовище у флаконах** | 3032BT200 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,78** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3032BT500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | мл | **9,19** | **8,59** |
| **Середовище у флаконах** | 9013BT100 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 100 | мл | **3,68** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 9013BT200 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,78** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 9013BT500 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 500 | мл | **9,19** | **8,59** |
| **Середовище у флаконах** | 3081BT100 | ТРИПТОЗА-СУЛЬФІТ ЦИКЛОСЕРИНОВИЙ АГАР (TSC) 0,4 g/l (Для виділення і підрахунку Clostridium perfringens з їжі, зразків води та клінічних зразків.) | Clostridium | 100 | мл | **5,89** | **4,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3081BT200 | ТРИПТОЗА-СУЛЬФІТ ЦИКЛОСЕРИНОВИЙ АГАР (TSC) 0,4 g/l (Для виділення і підрахунку Clostridium perfringens з їжі, зразків води та клінічних зразків.) | Clostridium | 200 | мл | **8,83** | **7,36** |
| **Середовище у флаконах** | 9014BT100 | ГЛЮКОЗНИЙ АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ ТА ЖОВЧЧЮ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Enterobacteriaceae | 100 | мл | **4,72** | **3,93** |
| **Середовище у флаконах** | 3046BT100 | ГЛЮКОЗНИЙ АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ ТА ЖОВЧЧЮ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Coliforms | 100 | мл | **5,12** | **4,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3046BT200 | ГЛЮКОЗНИЙ АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ ТА ЖОВЧЧЮ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Coliforms | 200 | мл | **7,66** | **6,38** |
| **Середовище у флаконах** | 3039BT200 | ВОДА ПЕПТОНОВА | розчини | 200 | мл | **4,42** | **3,68** |
| **Середовище у флаконах** | 3039BT25 | ВОДА ПЕПТОНОВА | розчини | 25 | мл | **1,78** | **1,48** |
| **Середовище у флаконах** | 3039BT90 | ВОДА ПЕПТОНОВА | розчини | 90 | мл | **3,54** | **2,95** |
| **Середовище у флаконах** | 3088BT100 | АГАР З ЕКСТРАКТОМ ДРІЖДЖІВ згідно З PN ISO 7954 (YGC агар) (Для вирощування та селективної ізоляції цвілевих грибів та дріжджів.) | Дріжджі/Плісені | 100 | мл | **4,13** | **3,44** |
| **Середовище у флаконах** | 3088BT200 | АГАР З ЕКСТРАКТОМ ДРІЖДЖІВ згідно З PN ISO 7954 (YGC агар) (Для вирощування та селективної ізоляції цвілевих грибів та дріжджів.) | Дріжджі/Плісені | 200 | мл | **6,48** | **5,40** |
| **Середовище у флаконах** | 3043BT225 | БУФЕРНА ПЕПТОНОВА ВОДА | розчини | 225 | мл | **5,75** | **4,79** |
| **Середовище у флаконах** | 3043BT500 | БУФЕРНА ПЕПТОНОВА ВОДА | розчини | 500 | мл | **9,60** | **8,00** |
| **Середовище у флаконах** | 3043BT90 | БУФЕРНА ПЕПТОНОВА ВОДА | розчини | 90 | мл | **3,83** | **3,19** |
| **Середовище у флаконах** | 3022BT100 | БУЛЬЙОН З СЕРЦЕВО-МОЗКОВИМ ЕКСТРАКТОМ (BHI бульон) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 100 | мл | **5,14** | **4,80** |
| **Середовище у флаконах** | 3022BT500 | БУЛЬЙОН З СЕРЦЕВО-МОЗКОВИМ ЕКСТРАКТОМ (BHI бульон) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 500 | мл | **11,29** | **10,55** |
| **Середовище у флаконах** | 3208BT100 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ГРИБІВ (CANDIDA) (Для виділення та диференціювання Candida spp) | Candida | 100 | мл | **10,76** | **10,06** |
| **Середовище у флаконах** | 3208BT200 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ГРИБІВ (CANDIDA) (Для виділення та диференціювання Candida spp) | Candida | 200 | мл | **17,43** | **16,29** |
| **Середовище у флаконах** | 3208BT500 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ГРИБІВ (CANDIDA) (Для виділення та диференціювання Candida spp) | Candida | 500 | мл | **41,01** | **38,33** |
| **Середовище у флаконах** | 3558BT100 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ORIENTATION (Для виділення та диференціювання патогенів сечовивідних шляхів, у тому числі грамнегативних та грамнегативних бактерій.) | Патогени сечовивідних шляхів | 100 | мл | **10,76** | **10,06** |
| **Середовище у флаконах** | 3558BT200 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ORIENTATION (Для виділення та диференціювання патогенів сечовивідних шляхів, у тому числі грамнегативних та грамнегативних бактерій.) | Патогени сечовивідних шляхів | 200 | мл | **17,43** | **16,29** |
| **Середовище у флаконах** | 3558BT500 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ORIENTATION (Для виділення та диференціювання патогенів сечовивідних шляхів, у тому числі грамнегативних та грамнегативних бактерій.) | Патогени сечовивідних шляхів | 500 | мл | **41,01** | **38,33** |
| **Середовище у флаконах** | 3015BT100 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР ОСНОВА (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 100 | мл | **5,64** | **5,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3015BT200 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР ОСНОВА (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 200 | мл | **8,21** | **7,67** |
| **Середовище у флаконах** | 3015BT500 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР ОСНОВА (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 500 | мл | **15,39** | **14,38** |
| **Середовище у флаконах** | 3012BT100 | ЖОВЧНО-ЕСКУЛІНОВИЙ АГАР З АЗИДОМ НАТРІЯ (ENTEROCOCCOSEL AGAR) | Enterococcus | 100 | мл | **6,15** | **5,75** |
| **Середовище у флаконах** | 3012BT200 | ЖОВЧНО-ЕСКУЛІНОВИЙ АГАР З АЗИДОМ НАТРІЯ (ENTEROCOCCOSEL AGAR) | Enterococcus | 200 | мл | **9,75** | **9,11** |
| **Середовище у флаконах** | 3012BT500 | ЖОВЧНО-ЕСКУЛІНОВИЙ АГАР З АЗИДОМ НАТРІЯ (ENTEROCOCCOSEL AGAR) | Enterococcus | 500 | мл | **23,08** | **21,57** |
| **Середовище у флаконах** | 3096BT100 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР згідно з EUCAST (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 100 | мл | **4,11** | **3,84** |
| **Середовище у флаконах** | 3096BT200 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР згідно з EUCAST (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 200 | мл | **6,15** | **5,75** |
| **Середовище у флаконах** | 3096BT500 | МЮЛЕР-ХІНТОН II АГАР згідно з EUCAST (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 500 | мл | **12,31** | **11,50** |
| **Середовище у флаконах** | 3117BT200 | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПТОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 200 | мл | **3,58** | **3,35** |
| **Середовище у флаконах** | 3117BT500 | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПТОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 500 | мл | **6,67** | **6,23** |
| **Середовище у флаконах** | 3111BT100 | АГАР КЛІГЛЕРА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози та декстрози та виділення сірководню.) | Диференційне середовище | 100 | мл | **5,64** | **5,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3111BT200 | АГАР КЛІГЛЕРА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози та декстрози та виділення сірководню.) | Диференційне середовище | 200 | мл | **8,46** | **7,91** |
| **Середовище у флаконах** | 3111BT500 | АГАР КЛІГЛЕРА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози та декстрози та виділення сірководню.) | Диференційне середовище | 500 | мл | **15,39** | **14,38** |
| **Середовище у флаконах** | 3112BT100 | ЦИТРАТНИЙ АГАР СІММОНСА (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі утилізації цитрату.) | Диференційне середовище | 100 | мл | **4,11** | **3,84** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Середовище у флаконах** | 3112BT200 | ЦИТРАТНИЙ АГАР СІММОНСА (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі утилізації цитрату.) | Диференційне середовище | 200 | мл | **5,64** | **5,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3112BT500 | ЦИТРАТНИЙ АГАР СІММОНСА (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі утилізації цитрату.) | Диференційне середовище | 500 | мл | **10,25** | **9,58** |
| **Середовище у флаконах** | 3524BT100 | БУЛЬЙОН КЛАРКА (Для диференціювання бактерій за допомогою метилового червоного і Voges-Proskauer реакцій.) | Диференційне середовище | 100 | мл | **4,11** | **3,84** |
| **Середовище у флаконах** | 3524BT200 | БУЛЬЙОН КЛАРКА (Для диференціювання бактерій за допомогою метилового червоного і Voges-Proskauer реакцій.) | Диференційне середовище | 200 | мл | **5,64** | **5,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3524BT500 | БУЛЬЙОН КЛАРКА (Для диференціювання бактерій за допомогою метилового червоного і Voges-Proskauer реакцій.) | Диференційне середовище | 500 | мл | **10,25** | **9,58** |
| **Середовище у флаконах** | 3011BT100 | ОСНОВА КРОВ'ЯНОГО АГАРУ | Середовище збагачення | 100 | мл | **4,11** | **3,84** |
| **Середовище у флаконах** | 3011BT200 | ОСНОВА КРОВ'ЯНОГО АГАРУ | Середовище збагачення | 200 | мл | **5,64** | **5,27** |
| **Середовище у флаконах** | 3011BT500 | ОСНОВА КРОВ'ЯНОГО АГАРУ | Середовище збагачення | 500 | мл | **10,25** | **9,58** |
| **Середовище у флаконах** | 3082BT500 | АГАР БАЙРД-ПАРКЕРА (Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus з їжі.) | Staphylococcus aureus | 500 | мл | **20,12** | **16,77** |
| **Середовище у флаконах** | 3065BT100 | ЖОВТКОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (M.Y.P) (Для селективної ізоляції Bacillus cereus) | Bacillus cereus | 100 | мл | **7,49** | **6,24** |
| **Середовище у флаконах** | 3065BT200 | ЖОВТКОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (M.Y.P) (Для селективної ізоляції Bacillus cereus) | Bacillus cereus | 200 | мл | **9,78** | **8,15** |
| **Середовище у флаконах** | 3065BT500 | ЖОВТКОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (M.Y.P) (Для селективної ізоляції Bacillus cereus) | Bacillus cereus | 500 | мл | **16,68** | **13,90** |
| **Середовище у флаконах** | 3533BT500 | СТАНДАРТНИЙ АГАР (МІКРОБНЕ ЧИСЛО) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Загальне мікробне забруднення | 500 | мл | **8,63** | **7,19** |
| **Середовище у флаконах** | 3204BT100 | БУЛЬЙОН РАПАПОРТА-ВАСИЛІАДІСА (RSV) | Salmonella | 100 | мл | **4,37** | **4,08** |
| **Середовище у флаконах** | 3204BT200 | БУЛЬЙОН РАПАПОРТА-ВАСИЛІАДІСА (RSV) | Salmonella | 200 | мл | **6,61** | **6,18** |
| **Середовище у флаконах** | 3204BT500 | БУЛЬЙОН РАПАПОРТА-ВАСИЛІАДІСА (RSV) | Salmonella | 500 | мл | **10,76** | **10,06** |
| **Середовище у флаконах** | 3006BT200 | ГЛЮКОЗО-ЖОВЧНИЙ АГАР З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Enterobacteriaceae | 200 | мл | **7,07** | **5,89** |
| **Середовище у флаконах** | 3006BT500 | ГЛЮКОЗО-ЖОВЧНИЙ АГАР З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Enterobacteriaceae | 500 | мл | **11,50** | **9,58** |
| **Середовище у флаконах** | 3046BT500 | КРИСТАЛВІОЛЕТ НЕЙТРАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ ЖОВЧНО-ЛАКТОЗНИЙ АГАР (VRBL) (Для виділення і підрахунку Коліформ з їжі.) | Coliforms | 500 | мл | **11,50** | **9,58** |
| **Середовище у флаконах** | 9016 01 | Ксилоза Лізин Деоксихолат агар (XLD) | Salmonella | 100 | мл | **4,61** | **3,84** |
| **Середовище у флаконах** | 3514BT100 | XLD агар (Ксилоза Лізин Деоксихолат агар) | Salmonella | 100 | мл | **3,85** | **3,60** |
| **Середовище у флаконах** | 9016 02 | Ксилоза Лізин Деоксихолат агар (XLD) | Salmonella | 200 | мл | **7,49** | **6,24** |
| **Середовище у флаконах** | 3514BT200 | XLD агар (Ксилоза Лізин Деоксихолат агар) | Salmonella | 200 | мл | **6,15** | **5,75** |
| **Середовище у флаконах** | 3514BT500 | XLD агар (Ксилоза Лізин Деоксихолат агар) | Salmonella | 500 | мл | **12,82** | **11,98** |
| **Середовище у пробірках** | 6136TB3 | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПТОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 3 | мл | **0,54** | **0,50** |
| **Середовище у пробірках** | 6136TB3S | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПТОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 3 | мл | **0,67** | **0,63** |
| **Середовище у пробірках** | 6136TB5S | 1% ПЕПТОНОВА ВОДА З ТРИПТОФАНОМ (Біохімічний тест диференціювання потенційно патогених бактерій родини Enterobacteriaceae шляхом виявлення продукції індолу) | Enterobacteriaceae | 5 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 8015TB7 | АГАР ТРИЦУКРОВИЙ ЗАЛІЗОВМІСНИЙ згідно з PN-ISO 6579:2003 (TSI AGAR) (для біохімічної диференціації мікроорганізмів на базі ферментації глюкози, лактози, сукрози та виділення сірководню) | Salmonella | 7 | мл | **0,76** | **0,63** |
| **Середовище у пробірках** | 6048TB15S | АГАР З ДРІЖДЖОВИМ ЕКСТРАКТОМ БЕЗ ГЛЮКОЗИ згідно з PN ISO 6222 (Для визначення загального мікробного забруднення у воді) | Загальне мікробне забруднення | 15 | мл | **1,46** | **1,22** |
| **Середовище у пробірках** | 6123TB7 | АГАР ЗВИЧАЙНИЙ (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 7 | мл | **0,74** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6015TB1 | STRAIN STORAGE AGAR | Агар для збереження культур | 1 | мл | **0,98** | **0,82** |
| **Середовище у пробірках** | 6020TB10S | СЕРЦЕВО-МОЗКОВА ВИТЯЖКА - БУЛЬЙОН (BHI BULION) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 10 | мл | **0,80** | **0,75** |
| **Середовище у пробірках** | 6020TB5 | СЕРЦЕВО-МОЗКОВА ВИТЯЖКА - БУЛЬЙОН (BHI BULION) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 5 | мл | **1,16** | **1,08** |
| **Середовище у пробірках** | 6020TB5S | СЕРЦЕВО-МОЗКОВА ВИТЯЖКА - БУЛЬЙОН (BHI BULION) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів, вибагливих до поживних речовин) | Середовище збагачення | 5 | мл | **0,80** | **0,75** |
| **Середовище у пробірках** | 6314TB5S | ЖОВЧНИЙ БУЛЬЙОН З ДІАМАНТОВИМ ЗЕЛЕНИМ (2%) (BGBB) (Для селективного збагачення бактерій кишкової палички у воді, їжі та молочних продуктах.) | Coliforms | 5 | мл | **0,88** | **0,73** |
| **Середовище у пробірках** | 6316TB9 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 9 | мл | **0,59** | **0,49** |
| **Середовище у пробірках** | 6316TB9S | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 9 | мл | **0,77** | **0,64** |
| **Середовище у пробірках** | 6179TB9 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН 0,85% NaCl з ПЕПТОНОМ | розчини | 9 | мл | **0,62** | **0,52** |
| **Середовище у пробірках** | 9017TB9 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl з ПЕПТОНОМ з PH 7,0 | розчини | 9 | мл | **0,77** | **0,64** |
| **Середовище у пробірках** | 6317TB9 | БУФЕРНИЙ РОЗЧИН NaCl з ПЕПТОНОМ з PH 7,0 | розчини | 9 | мл | **0,62** | **0,52** |
| **Середовище у пробірках** | 6006TB10 | БУЛЬЙОН ФРЕЙЗЕРА згідно з PN-EN ISO 11290 (Для селективного збагачення Listeria spp.) | Listeria | 10 | мл | **0,89** | **0,74** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Середовище у пробірках** | 6006TB10S | БУЛЬЙОН ФРЕЙЗЕРА згідно з PN-EN ISO 11290 (Для селективного збагачення Listeria spp.) | Listeria | 10 | мл | **1,03** | **0,86** |
| **Середовище у пробірках** | 6025TB10S | ТРИПТОНОВИЙ БУЛЬЙОН З ЛАУРИЛ СУЛЬФАТОМ (Для виявлення бактерій кишкової палички у воді та стічних водах.) | Coliforms | 10 | мл | **1,30** | **1,08** |
| **Середовище у пробірках** | 6173TB9S | БУЛЬЙОН з 0.1% ПЕПТОНУ і 2% TWEEN 80 | розчини | 9 | мл | **0,80** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6209TB5 | БУЛЬЙОН з 1% ГЛЮКОЗИ | Середовище збагачення | 5 | мл | **0,68** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6045TB5 | БУЛЬЙОН З АЦЕТАМІДОМ згідно з PN-EN 12780 а також PN-EN ISO 16266 (Для підтвердження Pseudomonas aeruginosa у воді.) | Pseudomonas aeruginosa | 5 | мл | **0,83** | **0,69** |
| **Середовище у пробірках** | 6111TB7 | АГАР КРІСТЕНСЕНА (для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі продукування уреази.) | Enterobacteriaceae | 7 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6133TB3 | БУЛЬЙОН КРІСТЕНСЕНА (для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі продукування уреази.) | Enterobacteriaceae | 3 | мл | **0,63** | **0,59** |
| **Середовище у пробірках** | 6147TB3 | БУЛЬЙОН КЛАРКА (Для диференціювання бактерій за допомогою метилового червоного і Voges-Proskauer реакцій.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,63** | **0,59** |
| **Середовище у пробірках** | 6213TB5S | ЕС БУЛЬЙОН (Для виявлення Коліформ при 37 ° С та Escherichia coli при 44,5 ° С.) | Escherichia coli | 5 | мл | **1,13** | **0,94** |
| **Середовище у пробірках** | 6091TB7 | ЖОВЧНО-ЕСКУЛІНОВИЙ АГАР З АЗИДОМ НАТРІЯ (ENTEROCOCCOSEL AGAR) | Enterococcus | 7 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6157TB9 | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 9 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6157TB9S | ЕУГОН LT 100 БУЛЬЙОН (для виділення аеробних бактерій, в тому числі E.coli) | Косметологія | 9 | мл | **0,85** | **0,79** |
| **Середовище у пробірках** | 6070TB7 | АГАР КЛІГЛЕРА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози та декстрози та виділення сірководню.) | Диференційне середовище | 7 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6124TB3 | АГАР КЛІГЛЕРА ЗАЛІЗОВМІСНИЙ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози та декстрози та виділення сірководню.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6161TB7S | АГАР ЛЕВЕНШТЕЙНА-ЙЕНСЕНА | 0 | 7 | мл | **1,11** | **1,04** |
| **Середовище у пробірках** | 6320TB11 | БУЛЬЙОН МЮЛЕРА-ХІНТОНА з КАТІОНАМИ (Для дослідження сприйнятливості швидко зростаючих аеробних і факультативно анаеробних бактерій, виділених з клінічних зразків.) | Антибіотико резистентність | 11 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6092TB10 | БУЛЬЙОН МЮЛЕРА-КАУФМАНА з НОВОБІОЦИНОМ (Для селективного збагачення Salmonella.) | Salmonella | 10 | мл | **0,85** | **0,79** |
| **Середовище у пробірках** | 6092TB10S | БУЛЬЙОН МЮЛЕРА-КАУФМАНА з НОВОБІОЦИНОМ (Для селективного збагачення Salmonella.) | Salmonella | 10 | мл | **1,03** | **0,96** |
| **Середовище у пробірках** | 6309TB5 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗЩЕПЛЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ З РАМНОЗОЮ згідно з PN-EN ISO 11290 (Для біохімічної диференціації Listeria spp.on на основі зброджування рамнози.) | Salmonella | 5 | мл | **0,83** | **0,69** |
| **Середовище у пробірках** | 6307TB5 | СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ РОЗЩЕПЛЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ З КСИЛОЗОЮ згідно з PN-EN ISO 11290 (Для біохімічної диференціації Listeria spp.on на основі зброджування ксилози.) | Listeria | 5 | мл | **0,83** | **0,69** |
| **Середовище у пробірках** | 6144TB3 | ІНДОЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ТРИПТОНО – ТРИПТОФАНОВЕ) (Для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі індольного виробництва. Реагенти: реагент Ерліха (Ref. № 3130), реагент Ковача (Ref. No.3135) | Enterobacteriaceae | 3 | мл | **0,68** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6132TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ ФАЛЬКОВА КОНТРОЛЬНЕ (Для біохімічної диференціації грамнегативних кишкових бактерій на основі дигідролази аргініну та лізину - орнітиндекарбоксилази.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6129TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ ФАЛЬКОВА З ЛІЗИНОМ (Для біохімічної диференціації грамнегативних кишкових паличок на основі лізину дігідролази.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6130TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ ФАЛЬКОВА З АРГІНІНОМ (Для біохімічної диференціації грамнегативних кишкових паличок на основі лізину дігідролази.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,62** | **0,58** |
| **Середовище у пробірках** | 6131TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ ФАЛЬКОВА З ОРНІТИНОМ (Для біохімічної диференціації грамнегативних кишкових бактерій на основі орнітиндекарбоксилази.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6137TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ УРЕАЗНО ІНДОЛОВЕ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі уреази, продукування індолу.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,68** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6128TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ З 10% ЛАКТОЗИ ТА БРОМКРЕЗОЛ ФІОЛЕТОВИМ ПІД ПАРАФІНОМ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі ферментації лактози.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6126TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ З ФЕНІЛАМІНОМ (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі дезамінування фенілоаланіну. Реагент: 10% FeCl3 (номер № 3134)) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6127TB3 | СЕРЕДОВИЩЕ З МАЛОНАТОМ | Середовище збагачення | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 8034TB5 | ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З АГАРОМ ТА ГЛЮКОЗОЮ ЗГІДНО З PN ISO 21528-1:2005 (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі зброджування глюкози.) | Диференційне середовище | 5 | мл | **0,83** | **0,69** |
| **Середовище у пробірках** | 6241TB3 | РР АГАР МОДИФІКОВАНИЙ (Для диференціювання Enterococcus spp. на основі рухливості.) | Enterococcus | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6141TB3 | РР ЧЕРВОНИЙ АГАР (Для диференціювання Enterobacteriaceae на основі рухливості та кольорової реакції.) | Enterobacteriaceae | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 9009TB10 | БУЛЬЙОН РАППОПОРТА-ВАСІЛІАДІСА | Salmonella | 10 | мл | **0,89** | **0,74** |
| **Середовище у пробірках** | 9009TB10S | БУЛЬЙОН РАППОПОРТА-ВАСІЛІАДІСА | Salmonella | 10 | мл | **1,04** | **0,87** |
| **Середовище у пробірках** | 6011TB10 | БУЛЬЙОН РАППОПОРТА-ВАСІЛІАДІСА згідно з PN ISO 6579 | Salmonella | 10 | мл | **0,79** | **0,74** |
| **Середовище у пробірках** | 6011TB10S | БУЛЬЙОН РАППОПОРТА-ВАСІЛІАДІСА згідно з PN ISO 6579 | Salmonella | 10 | мл | **0,93** | **0,87** |
| **Середовище у пробірках** | 6249TB2 | РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 2 | мл | **0,50** | **0,42** |
| **Середовище у пробірках** | 6249TB5 | РОЗЧИН 0,85% NaCl | розчини | 5 | мл | **0,58** | **0,48** |
| **Середовище у пробірках** | 6315TB9 | РОЗЧИН 0,85% NaCl з ПЕПТОНОМ | розчини | 9 | мл | **0,56** | **0,52** |
| **Середовище у пробірках** | 6149TB2 | РОЗЧИН 0,9% NaCl | розчини | 2 | мл | **0,56** | **0,52** |
| **Середовище у пробірках** | 6149TB3 | РОЗЧИН 0,9% NaCl | розчини | 3 | мл | **0,62** | **0,52** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Середовище у пробірках** | 6149TB5 | РОЗЧИН 0,9% NaCl | розчини | 5 | мл | **1,08** | **1,01** |
| **Середовище у пробірках** | 6149TB9 | РОЗЧИН 0,9% NaCl | розчини | 9 | мл | **0,62** | **0,52** |
| **Середовище у пробірках** | 6304TB7 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І АКТІДІОНОМ | Дріжджі/Плісені | 7 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6303TB7 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 7 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6301TB7 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І ГЕНТАМІЦИНОМ | Дріжджі/Плісені | 7 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6010TB5 | БУЛЬЙОН САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 5 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6100TB10S | БУЛЬЙОН ШЕДЛЕРА | анаеробні мікроорганізми | 10 | мл | **0,78** | **0,73** |
| **Середовище у пробірках** | 6102TB10 | БУЛЬЙОН ШЕДЛЕРА з ВІТ. К-3 І 0,02% АГАРУ | анаеробні мікроорганізми | 10 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6101TB10 | БУЛЬЙОН ШЕДЛЕРА з ВІТ. К-3 І 0,02% АГАРУ | анаеробні мікроорганізми | 10 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6313TB5 | ЦИСТИН-СЕЛЕНІТОВИЙ БУЛЬЙОН (Для селективного збагачення Salmonella з клінічних зразків.) | Salmonella | 5 | мл | **0,71** | **0,59** |
| **Середовище у пробірках** | 6030TB2 | СЕЛЕНІТОВИЙ БУЛЬЙОН F (Для селективного збагачення Salmonella) | Salmonella | 2 | мл | **0,63** | **0,59** |
| **Середовище у пробірках** | 6030TB5 | СЕЛЕНІТОВИЙ БУЛЬЙОН F (Для селективного збагачення Salmonella) | Salmonella | 5 | мл | **0,63** | **0,59** |
| **Середовище у пробірках** | 6125TB3 | ЦИТРАТНИЙ АГАР СІММОНСА (Для біохімічної диференціації мікроорганізмів на основі утилізації цитрату.) | Диференційне середовище | 3 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6150TB7S | СЕРЕДОВИЩЕ СТОУНБРІНКА(Для вирощування Mycobacterium spp.) | Mycobacterium | 7 | мл | **1,13** | **1,06** |
| **Середовище у пробірках** | 6040TB5 | ТІОГЛІКОЛЕВИЙ БУЛЬЙОН (для культивації широкого спектру мікроорганізмів.) | Середовище збагачення | 5 | мл | **0,68** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6090TB5 | БУЛЬЙОН TODD-HEWITT (Для вирощування Streptococcus spp. Та інших вибагливих мікроорганізмів.) | Streptococcus | 5 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6089TB2 | БУЛЬЙОН TODD-HEWITT з ГЕНТАМІЦИНОМ І НАЛІДИКСОВОЮ КИСЛОТОЮ (Для селективного збагачення групи стрептококів В, особливо Streptococcus agalactiae (GBS).) | Streptococcus | 2 | мл | **0,80** | **0,75** |
| **Середовище у пробірках** | 6089TB5 | БУЛЬЙОН TODD-HEWITT з ГЕНТАМІЦИНОМ І НАЛІДИКСОВОЮ КИСЛОТОЮ (Для селективного збагачення групи стрептококів В, особливо Streptococcus agalactiae (GBS).) | Streptococcus | 5 | мл | **0,89** | **0,83** |
| **Середовище у пробірках** | 6088TB5 | БУЛЬЙОН TODD-HEWITT з ХОЛІСТИНОМ І НАЛІДИКСОВОЮ КИСЛОТОЮ (Для селективного збагачення групи стрептококів В, особливо Streptococcus agalactiae (GBS).) | Streptococcus | 5 | мл | **0,89** | **0,83** |
| **Середовище у пробірках** | 6120TB2,5 | TRICHOMEDIUM (Для селективного збагачення Trichomonas vaginalis.) | Trichomonas | 2,5 | мл | **0,70** | **0,65** |
| **Середовище у пробірках** | 6093TB7 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 7 | мл | **0,72** | **0,67** |
| **Середовище у пробірках** | 6080TB10 | ТРИПТОННО-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 10 | мл | **0,66** | **0,62** |
| **Середовище у пробірках** | 6080TB10S | ТРИПТОННО-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 10 | мл | **0,79** | **0,74** |
| **Середовище у пробірках** | 6080TB2 | ТРИПТОННО-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 2 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6080TB5 | ТРИПТОННО-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН (TSB) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 5 | мл | **0,61** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6019TB9 | БУФЕРНА ПЕПТОННА ВОДА | розчини | 9 | мл | **0,68** | **0,57** |
| **Середовище у пробірках** | 6211TB5 | Ферментативне середовище з рамнозою (для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі ферментації рамнози) | Диференційне середовище | 5 | мл | **1,28** | **1,20** |
| **Середовище у пробірках** | 6206TB5 | Ферментативне середовище з ксилозою (для біохімічної диференціації Enterobacteriaceae на основі ферментації ксилози) | Диференційне середовище | 5 | мл | **1,28** | **1,20** |
| **Середовища COUNT TACT** | 7019PD65 | МАККОНКІ АГАР З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ COUNT-TACT (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 65 | мм | **1,45** | **1,21** |
| **Середовища COUNT TACT** | 7012PD65 | АГАР З СОЛОДОВОГО ЕКСТРАКТУ З ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І СТРЕПТОМІЦИНОМ COUNT-TACT | Дріжджі/Плісені | 65 | мм | **1,48** | **1,38** |
| **Середовища COUNT TACT** | 7020PD65 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ ТА ЛЕЦИТИНОМ & TWEEN 80 COUNT-TACT | Дріжджі/Плісені | 65 | мм | **1,29** | **1,21** |
| **Середовища COUNT TACT** | 7015PD65 | СТАНДАРТНИЙ АГАР (PCA) COUNT-TACT | Загальне мікробне забруднення | 65 | мм | **1,45** | **1,21** |
| **Середовища COUNT TACT** | 7010PD65 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) з ЛЕЦИТИНОМ & TWEEN 80 COUNT-TACT (Для ізоляції мікроорганізмів з дезінфікованих поверхонь з четвертичним сполуками амонію.) | Загальне мікробне забруднення | 65 | мм | **1,14** | **1,07** |
| **Середовища COUNT TACT** | 7013PD65 | ЖОВЧНИЙ АГАР (VRBG) COUNT-TACT | Enterobacteriaceae | 65 | мм | **1,66** | **1,38** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8003PD90 | АГАР САБУРО З ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,60** | **0,56** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8002PD90 | АГАР САБУРО З ГЛЮКОЗОЮ, БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІНОМ І ТЕТРАКЦИЛІНОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,74** | **0,62** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1166PD90 | АГАР ЗБАГАЧЕНИЙ | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8005PD90 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (селективне виділення Ps.aeruginosa, згідно ISO 22717) | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **0,77** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8012PD90 | АГАР ДЕЗОКСИХОЛАТ ЦИТРАТНИЙ (селективне середовище, для виділення кишкових патогенних мікроорганізмів Сальмонели та Шигели) | Salmonella | 90 | мм | **0,77** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8030PD90 | АГАР З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ І ГЛЮКОЗОЮ згідно З PN ISO 7218 (Для виділення плісеней та дріжджів з навколишнього середовища) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1528PD90 | АГАР З ЕСКУЛІНОМ,СОЛЯМИ ЖОВЧІ І АЗИДОМ ЗГІДНО З PN-ISO 7899 (Для селективної ізоляції та підрахунку Enterococcus spp. у воді методом мембранної фільтрації) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8008PD90 | АГАР З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ, МЕТИЛРОТОМ, ЖОВЧЮ І ГЛЮКОЗОЮ (VRBG) (для підрахунку Ентеробактерій в продуктах харчування) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **0,72** | **0,60** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чашки Петрі 90мм** | 8001PD90 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ АГАР (TRYPTIC SOY AGAR) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,60** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1504PD90 | АГАР ЗВИЧАЙНИЙ (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,58** | **0,48** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1343PD90 | ALOA АГАР згідно З PN-EN ISO 11290 (Для селективної ізоляції, підрахунку та ідентифікації Listeria spp. та Listeria monocytogenes з проб харчових продуктів) | Listeria | 90 | мм | **1,88** | **1,57** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1112PD90 | ЖОВЧНО-КРОВ'ЯНИЙ АГАР 5% З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ (Для селективної ізоляції Streptococcus spp. з клінічних та неклінічних зразків) | Streptococcus | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1320PD90 | АГАР БАЙРД-ПАРКЕРА (Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus з їжі.) | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **0,79** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8004PD90 | АГАР БАЙРД-ПАРКЕРА (Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus з їжі.) | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **0,89** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2155PD90 | АГАР БАЙРДА-ПАРКЕРА/АГАР МАККОНКІ | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **1,19** | **0,99** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1321PD90 | АГАР БАЙРДА-ПАРКЕРА + RPF згідно З PN-EN ISO 6888-2 (Для селективної ізоляції та підрахунку Staphylococcus aureus з їжі.) | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **2,83** | **2,36** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8050PD90 | BCYE - БЕЗ ЦИСТЕЇНУ (АГАР З ВУГІЛЛЯМ І ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ) (Для виділення Legionella spp.) | Legionella | 90 | мм | **2,00** | **1,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8049PD90 | BCYE (АГАР З ВУГІЛЛЯМ І ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ) (Для виділення Legionella spp.) | Legionella | 90 | мм | **2,00** | **1,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2067PD90 | BCYE АГАР / BCYE АГАР З ЦИСТЕЇНОМ (Для виділення Legionella spp.) | Legionella | 90 | мм | **2,47** | **2,06** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1168PD90 | СЕРЦЕВО-МОЗКОВИЙ АГАР (BHI) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1162PD90 | BHI АГАР З ВАНКОМІЦИНОМ (6 mg/l) (Для селективної ізоляції Enterococcus spp. з високим рівнем стійкості до ванкоміцину.) | Enterococcus | 90 | мм | **0,68** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1110PD90 | КРОВ'ЯНИЙ АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,56** | **0,52** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1110APD90 | КРОВ'ЯНИЙ АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ згідно з PN ISO 11290-1 (Для селективної ізоляції, підрахунку та ідентифікації Listeria spp. та Listeria monocytogenes.) | Listeria | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1186PD90 | СЕРЦЕВО-МОЗКОВИЙ АГАР З ТЕЛУРИТОМ КАЛІЮ (Для виділення та диференціювання Enterococcus spp.) | Enterococcus | 90 | мм | **0,77** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1360PD90 | МОДИФІКОВАНИЙ АГАР З БРИЛІАНТОВИМ ЗЕЛЕНИМ (BGA) | Salmonella | 90 | мм | **0,70** | **0,58** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1039PD90 | АГАР З ЖОВЧЮ, ЕСКУЛІНОМ І ГЕНТАМИЦИНОМ ДЛЯ БРУЦЕЛ | Brucella | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1033PD90 | АГАР З 5% КОНЯЧОЇ КРОВІ ДЛЯ БРУЦЕЛ (Для культивування Brucella spp. та інших чутливих мікроорганізмів, включаючи Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Neisseria meningitidis.) | Brucella | 90 | мм | **0,72** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1043PD90 | АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ, ВІТАМІНОМ К І ТА ГЕМІНОМ ДЛЯ БРУЦЕЛ | Brucella | 90 | мм | **0,79** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1501PD90 | СОЛОДОВИЙ АГАР (WORT AGAR) (Для ізоляції та підрахунку дріжджів.) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,72** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1016PD90 | АГАР ДЛЯ BURKHOLDERIA CEPACIA (для селективного виділення Burkholderia Cepacia.) | Burkholderia | 90 | мм | **1,21** | **1,13** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1310PD90 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **0,74** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9001PD90 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР (для селективного виділення Pseudomonas aeruginosa) | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **0,74** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2110PD90 | ЦЕТРИМІДНИЙ АГАР / АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,48** | **1,23** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1080PD90 | ШОКОЛАДНИЙ АГАР З БІОВІТЕКСОМ (Для вирощування широкого спектру патогенних мікроорганізмів, у тому числі Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus spp.) | Haemophilus, Neisseria | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1481PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ACINETOBACTER (Для селективного виділення Acinetobacter spp.) | Acinetobacter | 90 | мм | **2,26** | **2,11** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1400PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ГРИБІВ (CANDIDA) (Для виділення та диференціювання Candida spp) | Candida | 90 | мм | **1,32** | **1,23** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1401PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ (ECC) (Для виділення і підрахунку Escherichia coli та інших мікроорганізмів з харчових, клінічних та проб води) | Escherichia coli | 90 | мм | **2,18** | **2,04** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1470PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВОГО ТРАКТУ (ESBL) (Для селективної ізоляції бактерій, що продукують ESBL.) | ESBL-продукуючі мікроорганізми | 90 | мм | **1,79** | **1,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2057PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ESBL / ХРОМОГЕННИЙ АГАР VRE | подвійна чашка | 90 | мм | **2,05** | **1,92** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1471PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР KPC (Для селективної ізоляції та диференціації грамнегативних бактерій зі зниженою сприйнятливістю до більшості карбапенемів.) | Карбопенем-резистентні | 90 | мм | **1,79** | **1,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2068PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР KPC / ХРОМОГЕННИЙ АГАР ESBL | подвійна чашка | 90 | мм | **2,00** | **1,87** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2034PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР MASTITIS (Для ізоляції та диференціювання патогенних мікроорганізмів, викликаючих мастит.) | Мастити | 90 | мм | **2,89** | **2,70** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1402PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР MRSA (Для селективної ізоляції метицилін-резистентного Staphylococcus aureus (MRSA)) | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **1,53** | **1,43** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2048PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР MRSA / ХРОМОГЕННИЙ АГАР (STAPHYLOCOCCUS AUREUS) | подвійна чашка | 90 | мм | **2,20** | **2,06** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1430PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ДЛЯ КИШКОВОЇ ПАЛИЧКИ (O157) (Для селективної ізоляції Escherichia coli O157.) | Escherichia coli | 90 | мм | **2,58** | **2,41** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1410PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР ORIENTATION (Для виділення та диференціювання патогенів сечовивідних шляхів, у тому числі грампозитивних та грамнегативних бактерій.) | Патогени сечовивідних шляхів | 90 | мм | **1,13** | **1,06** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1480PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР PSEUDOMONAS (Для виділення і підрахунку Pseudomonas spp. з харчових, клінічних зразків та води) | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **2,36** | **2,21** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1420PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР SALMONELLA (Для виділення і підрахунку Salmonella spp, Escherichia coli та Proteus spp. з харчових, клінічних та водяних зразків) | Salmonella | 90 | мм | **1,79** | **1,67** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чашки Петрі 90мм** | 1421PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР SALMONELLA PLUS (Для селективного виділення Salmonella spp, включаючи Salmonella typhi, Salmonella paratyphi та лактозопозитивних сальмонел) | Salmonella | 90 | мм | **1,73** | **1,62** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2134PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР SALMONELLA PLUS / SALMONELLA SHIGELLA АГАР | подвійна чашка | 90 | мм | **1,73** | **1,62** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1404PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР STAPHYLOCOCCUS AUREUS | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **1,53** | **1,43** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1381PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР STEC (Для виділення та диференціювання Escherichia coli (STEC)) | Escherichia coli (STEC) | 90 | мм | **2,89** | **2,70** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1007PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР STREP B (Для селективного ізоляції Streptococcus agalactiae. | Streptococcus | 90 | мм | **1,89** | **1,77** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1460PD90 | ХРОМОГЕННИЙ АГАР VRE (Для селективної ізоляції та диференціювання штамів Enterococcus, що мають резистентність до ванкоміцину. E. faecalis та E. faecium.) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **2,58** | **2,41** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1423PD90 | ХРОМОГЕННИЙ COLIFORM АГАР згідно з ISO 9308-1:2014 (визначення та підрахунок E.Coli в зразках води методом мембранної фільтрації) | Escherichia coli | 90 | мм | **1,84** | **1,72** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1424PD90 | ХРОМОГЕННИЙ COLIFORM CFS згідно з ISO 9308-1:2014 (визначення та підрахунок E.Coli в зразках води методом мембранної фільтрації) | Escherichia coli | 90 | мм | **1,84** | **1,72** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1030PD90 | ЦИСТИН-ЛАКТОЗА-ЕЛЕКТРОЛІТ-ДЕФІЦИТНИЙ АГАР (CLED AGAR) (Для диференціювання та підрахунку мікроорганізмів в сечі) | мікроорганізми в сечі | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1005PD90 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE АГАР (Для виділення Clostridium difficile) | Clostridium | 90 | мм | **1,53** | **1,43** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1196PD90 | АГАР КОЛУМБІЯ З 5% КОНЯЧОЇ КРОВІ (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2091PD90 | АГАР КОЛУМБІЯ З 5 % БАРАНЯЧОЇ КРОВІ / HAEMOPHILUS CHOCOLATE АГАР | подвійна чашка | 90 | мм | **1,16** | **1,08** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1190PD90 | АГАР КОЛУМБІЯ Z 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,45** | **0,42** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2086PD90 | АГАР КОЛУМБІЯ Z 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ / HAEMOPHILUS CHOCOLATE АГАР З БІОВІТЕКСОМ І БАЦИТРАЦИНОМ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,10** | **1,03** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1194PD90 | АГАР КОЛУМБІЯ З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ, ГЕНТАМИЦИНОМ І ПОЛІМИКСИНОМ (Для селективної ізоляції β-гемолізу Streptococcus spp.) | Streptococcus | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1193PD90 | АГАР КОЛУМБІЯ З ТЕЛУРИНОМ КАЛІЮ (Для виділення та диференціювання Enterococcus spp.) | Enterococcus | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1191PD90 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для ізоляції та росту вибагливих мікроорганізмів. Дозволяє виявити гемоліз.) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,51** | **0,48** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2022PD90 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ / ENTEROCOCCOSEL АГАР | подвійна чашка | 90 | мм | **1,10** | **1,03** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2052PD90 | КОЛУМБІЯ CNA АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ /HAEMOPHILUS CHOCOLATE АГАР З БІОВІТЕКСОМ І БАЦИТРАЦИНОМ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,21** | **1,13** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2044PD90 | КОЛУМБІЯ CNA З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ / CHROMAГАР ORIENTATION | подвійна чашка | 90 | мм | **1,10** | **1,03** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1014PD90 | АГАР ЧАПЕКА ДЛЯ ГРИБІВ (Для вирощування ацидофільних організмів, таких як дріжджі.) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,89** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1452PD90 | DERMA TEST АГАР (Для селективної ізоляції дерматофітних грибів) | Дерматофіти | 90 | мм | **0,95** | **0,89** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1115PD90 | ДИХЛОРАН ГЛІЦЕРОЛ АГАР DG-18 (Для селективного виділення і підрахунку дріжджів і пліseней вд харчових продуктах) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,89** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1508PD90 | АГАР З ДИХЛОРАНОМ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ ТА БЕНГАЛЬСЬКИМ РОЖЕВИМ (DRBC) (Для селективного виділення і підрахунку дріжджів і пліseней вд харчових продуктах) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1220PD90 | МОДИФІКОВАНИЙ АГАР ЕДВАРДСА З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для селективного виділення Streptococcus agalactiae та інших видів Streptococcus spp.) | Streptococcus | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1070PD90 | АГАР ДЛЯ ЕНТЕРОКОКІВ ENTEROCOCCOSEL AGAR (BILE ESCULINE AZIDE AGAR) (Для селективного виділення та диференціювання стрептококу групи D.) | Enterococcus | 90 | мм | **0,77** | **0,72** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1240PD90 | АГАР ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ГРИБІВ З ФЕНОЛОВИМ ЧЕРВОНИМ (FUNGISEL AGAR WITH PHENOL RED)(Для селективного виділення дерматофітних грибів) | Дерматофіти | 90 | мм | **0,79** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8051PD90 | АГАР З ВУГІЛЛЯМ, ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ І АНТИБІОТИКАМИ (GVPC) (Для селективного виділення Legionella spp.) | Legionella | 90 | мм | **2,53** | **2,11** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1261PD90 | ШОКОЛАДНИЙ АГАР ДЛЯ HEMOPHILIUS (Для селективного виділення Haemophilus influenzae.) | Haemophilus | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1060PD90 | ГЕКТОЕНОВИЙ ЕНТЕРОАГАР (селективний та диференційний агар для виділення сальмонели та шигели з зразків хворого.) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **0,74** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1015PD90 | АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФЛЮОРЕСЦЕЇНА ПСЕВДОМОНАД згідно З PN ISO 12780 ТА PN-EN ISO 16266 (Для селективного виявлення Pseudomonas aeruginosa на основі продукування флуоресцину.) | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **0,89** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1512PD90 | MRS АГАР ДЛЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ | Lactic Acid Bacteria | 90 | мм | **0,68** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1011PD90 | АГАР ЛЕВІНА З ЕОЗИНОМ І МЕТИЛЕНОВИМ СИНІМ (LEMB) (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 90 | мм | **0,68** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8041PD90 | ЖОВТКОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (M.Y.P) згідно з PN EN ISO 7932 (Для селективної ізоляції Bacillus cereus з їжі.) | Bacillus cereus | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1020PD90 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 90 | мм | **0,43** | **0,40** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9003PD90 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (Для виділення і диференціювання грамнегативних кишкових паличок.) | Грам (-) палички | 90 | мм | **0,58** | **0,48** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2040PD90 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ / КОЛУМБІЯ З 5 % БАРАНЯЧОЇ КРОВІ | подвійна чашка | 90 | мм | **0,95** | **0,89** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2020PD90 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ / САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ ТА ГЕНТАМІЦИНОМ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,01** | **0,94** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чашки Петрі 90мм** | 2050PD90 | АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ /КОЛУМБІЯ CNA АГАР З 5 % БАРАНЯЧОЇ КРОВІ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,06** | **0,99** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1021PD90 | АГАР МАККОНКІ З СОРБІТОЛОМ (Для виділення патогенної Escherichia coli.) | Escherichia coli | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1026PD90 | АГАР МАККОНКІ CS (Для виділення та диференціювання грамнегативних кишкових паличок з зразків, що містять забруднюючі штами Proteus spp.) | Грам (-) палички | 90 | мм | **0,56** | **0,52** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1523PD90 | СОЛОДОВО ПЕПТОННИЙ АГАР З ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І СТРЕПТОМІЦИНОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1050PD90 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (для виділення Staphylococcus spp.) | Staphylococcus | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9005PD90 | СОЛЬОВИЙ АГАР З МАНІТОМ (для виділення Staphylococcus spp.) | Staphylococcus | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1008PD90 | МОДИФІКОВАНИЙ АГАР З ВУГІЛЛЯМ ЦЕФОПЕРАЗОНОМ ТА ДЕЗОКСИХОЛАТОМ (MCCD) згідно з PN ISO 10272-1:2006 (Для ізоляції Campylobacter spp.) | Campylobacter | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1032PD90 | m-CP АГАР ДЛЯ КЛОСТРИДІЙ згідно директиви 98/83/WE (Для виділення Clostridium perfringens у воді методом мембранної фільтрації.) | Clostridium perfringens | 90 | мм | **2,05** | **1,92** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1513PD90 | АГАР ДЛЯ ПІДРАХУНКУ КОЛОНІЙ З МОЛОКОМ (ля виділення і підрахунку мікроорганізмів у молоці та молочних продуктах. | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,72** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1062PD90 | MRS АГАР ДЛЯ ЛАКТОБАКТЕРІЙ | Lactic Acid Bacteria | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1173PD90 | MRSA АГАР(Для селективної ізоляції метицилін-резистентного Staphylococcus aureus (MRSA)) | Staphylococcus aureus | 90 | мм | **0,56** | **0,52** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1051PD90 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР згідно з EUCAST (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 90 | мм | **0,41** | **0,38** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2028PD90 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР/МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР | Антибіотико резистентність | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1172PD90 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1370PD90 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР З 5% КОНЯЧОЇ КРОВІ + 20mg/l НАД (MH-F) (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 90 | мм | **0,61** | **0,57** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1216PD90 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР З КЛОКСАЦИЛІНОМ (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів широкого спектру мікроорганізмів, зокрема, Haemophilus influenzae за допомогою дифузійного методу.) | Антибіотико резистентність | 90 | мм | **1,58** | **1,48** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1503PD90 | ЖИВИЛЬНИЙ АГАР 1,5% (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1113PD90 | OGYE АГАР | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1292PD90 | OXFORD АГАР | Listeria | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1502PD90 | PALCAM АГАР | Listeria | 90 | мм | **0,89** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1063PD90 | КАРТОПЛЯНИЙ АГАР З ДЕКСТРОЗОЮ (PDA) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **1,19** | **0,99** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1176PD90 | МІКОЛОГІЧНИЙ АГАР (Для використання в аналізі антимікотичної сприйнятливості методом дифузії диска.) | чутливість | 90 | мм | **1,21** | **1,13** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1119PD90 | MYPGP АГАР (Paenibacillus larvae хвороба бджіл) | Paenibacillus larvae | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1023PD90 | ОСНОВА З НИСТАТИНОМ І АКТИДІОНОМ | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9007PD90 | КАРТОПЛЯНИЙ АГАР З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1236PD90 | КАРТОПЛЯНИЙ АГАР З ДЕКСТРОЗОЮ ТА ХЛОРФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1022PD90 | АГАР ДЛЯ ПСЕВДОМОНАД CN згідно З PN ISO 12780 А ТАКОЖ PN-EN ISO 16266 | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1507PD90 | АГАР ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПСЕВДОМОНАД | Pseudomonas aeruginosa | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1544PD90 | R2 АГАР (СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГЕТЕРОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПИТНІЙ ВОДІ) | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8044PD90 | R2 АГАР (СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГЕТЕРОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПИТНІЙ ВОДІ) | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9018PD90 | R2 АГАР (СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ГЕТЕРОТРОФНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПИТНІЙ ВОДІ) | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1230PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9010PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1239PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ ТА ГЕНТАМІЦИНОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2017PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ / FUNGISEL АГАР З ФЕНОЛРОТОМ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,27** | **1,19** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1231PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ І ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1233PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І АКТІОДИНОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,64** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1232PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І ГЕНТАМІЦИНОМ | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,61** | **0,57** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2051PD90 | АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ/АГАР САБУРО З ДЕКСТРОЗОЮ, ХЛОРАМФЕНІКОЛОМ І АКТІОДИНОМ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,66** | **1,55** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1250PD90 | АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ САЛЬМОНЕЛЛ-ШИГЕЛЛ (SS agar) | Salmonella | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2014PD90 | АГАР ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ САЛЬМОНЕЛЛ-ШИГЕЛЛ / ГЕКТОЕНОВИЙ ЕНТЕРОАГАР | подвійна чашка | 90 | мм | **1,06** | **0,99** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чашки Петрі 90мм** | 1201PD90 | ШЕДЛЕР АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ І ВІТАМІНОМ К (Для культивації анаеробних мікроорганізмів) | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1200PD90 | ШЕДЛЕР АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1295PD90 | ШЕДЛЕР АГАР З ГЕНТАМІЦИНОМ І З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,58** | **0,54** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1202PD90 | ШЕДЛЕР CNA АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для селективної ізоляції анаеробних грампозитивних кокків Peptococcus та Peptostreptococcus spp. БАД: холістин, налідиксова кислота (Ref.No. X011)) | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,90** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1207PD90 | ШЕДЛЕР КАНАМІЦИН СТРЕПТОМІЦИН АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для селективної ізоляції анаеробних грамнегативних мікроорганізмів, особливо Bacteroides spp.) | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,85** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1205PD90 | ШЕДЛЕР НЕОМІЦИН ВАНКОМІЦИН АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,85** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 2021PD90 | ШЕДЛЕР АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ І ВІТАМІНОМ К / ШЕДЛЕР КАНАМІЦИН СТРЕПТОМІЦИН АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ | подвійна чашка | 90 | мм | **1,16** | **1,08** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8019PD90 | СЛАНЦ-БАРТЛІ АГАР згідно з PN ISO 7899-2 (Для ізолювання та перерахування Enterococcus spp. У воді методом мембранної фільтрації.) | Enterococcus | 90 | мм | **0,68** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1342PD90 | СТАНДАРТНИЙ АГАР (МІКРОБНЕ ЧИСЛО) | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,72** | **0,60** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1199PD90 | СТАНДАРТНИЙ АГАР З ЛЕЦИТИНОМ І TWEEN 80 | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1083PD90 | МОДИФІКОВАНИЙ АГАР ТАЄРА МАРТІ (THAYER MARTIN) (Для селективної ізоляції Neisseria gonorrhoeae та Neisseria meningitidis.) | Neisseria | 90 | мм | **0,79** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1180PD90 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,60** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9012PD90 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,54** | **0,50** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1181PD90 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) з 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 90 | мм | **0,61** | **0,57** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1013PD90 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) з ЛЕЦИТИНОМ & TWEEN 80 (Для ізоляції мікроорганізмів з дезінфікованих поверхонь з четвертичним сполуками амонію.) | Загальне мікробне забруднення | 90 | мм | **0,61** | **0,57** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8054PD90 | ТРИПТОЗА-СУЛЬФІТ ЦИКЛОСЕРИНОВИЙ АГАР (TSC) (без ЦИКЛОСЕРИНУ) згідно з PN EN ISO 7937 | Clostridium perfringens | 90 | мм | **1,48** | **1,23** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8022PD90 | ТРИПТОЗА-СУЛЬФІТ ЦИКЛОСЕРИНОВИЙ АГАР (TSC) з ЦИКЛОСЕРИНОМ 0,4 g/l | Clostridium perfringens | 90 | мм | **1,66** | **1,38** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1019PD90 | ТРИПТОН-СОЄВИЙ БУЛЬЙОН З ДРІЖДЖЕВИМ ЕКСТРАКТОМ (TSYEA) згідно з PN EN ISO 11290 | Listeria | 90 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8029PD90 | ТТС АГАР з ТЕРГІТОЛОМ згідно з PN-EN ISO 9308 (Для селективної ізоляції бактерій кишкової палички, раннє виявлення Escherichia coli.) | Escherichia coli | 90 | мм | **0,77** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1341PD90 | ГЛЮКОЗО-ЖОВЧНИЙ АГАР З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **0,80** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1340PD90 | КРИСТАЛВІОЛЕТ НЕЙТРАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ ЖОВЧНО-ЛАКТОЗНИЙ АГАР (VRBL) (Для виділення і підрахунку Коліформ з їжі.) | Coliforms | 90 | мм | **0,80** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9014PD90 | ГЛЮКОЗО-ЖОВЧНИЙ АГАР З КРИСТАЛІЧНИМ ФІОЛЕТОВИМ (VRBG) (Для виділення і підрахунку Enterobacteriaceae з їжі.) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **0,80** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1204PD90 | АГАР ВІЛКІНСА ЧАЛГРЕНА з 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для культивації анаеробних мікроорганізмів) | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **1,06** | **0,99** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1010PD90 | ВІЛКІНС ХОБС АГАР (Для культивації анаеробних мікроорганізмів) | анаеробні мікроорганізми | 90 | мм | **0,74** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1330PD90 | КСИЛОЗНО-ЛІЗИНОВИЙ ДЕЗОКСИХОЛАТНИЙ АГАР (XLD) | Salmonella | 90 | мм | **0,68** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 9016PD90 | КСИЛОЗНО-ЛІЗИНОВИЙ ДЕЗОКСИХОЛАТНИЙ АГАР (XLD) | Salmonella | 90 | мм | **0,77** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8013PD90 | КСИЛОЗНО-ЛІЗИНОВИЙ ДЕЗОКСИХОЛАТНИЙ АГАР (XLD) згідно з PN ISO 6579 | Salmonella | 90 | мм | **0,68** | **0,64** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1518PD90 | КСИЛОЗНО ЛІЗИНОВИЙ ТЕРГІТОЛ 4 АГАР (XLT-4) | Salmonella | 90 | мм | **0,79** | **0,74** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1280PD90 | АГАР GARDNERELLA VAGINALIS, 90 мм | Gardnerella vaginalis | 90 | мм | **1,33** | **1,24** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1090PD90 | АГАР ДЛЯ ЕРСІНІЙ (YERSINIA CIN) | Yersinia | 90 | мм | **1,04** | **0,87** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8047PD90 | АГАР ДЛЯ ЕКСТРАКТУ ДРІЖДЖІВ (YGC) згідно з PN ISO 7218 (для виділення зі зразків оточуючого середовища) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 8036PD90 | АГАР ДЛЯ ЕКСТРАКТУ ДРІЖДЖІВ (YGC) згідно з PN ISO 7954 | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **1,01** | **0,84** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1541PD90 | СОЛОДОВО-ДРІЖДЖЕВИЙ АГАР (YM) | Дріжджі/Плісені | 90 | мм | **0,95** | **0,79** |
| **Чашки Петрі 90мм** | 1350PD90 | СЕРЕДОВИЩЕ ЕНДО (ENDO AGAR) | Enterobacteriaceae | 90 | мм | **0,87** | **0,81** |
| **Чашки Петрі 140мм** | 1343PD140 | ALOA АГАР згідно з PN-EN ISO 11290 | Listeria | 140 | мм | **2,47** | **2,06** |
| **Чашки Петрі 60мм** | 8018PD60 | ЕНДО LES АГАР згідно з PN-EN ISO 9308 (Для виділення і підрахунку бактерій кишкової палички у воді методом мембранної фільтрації.) | Coliforms | 60 | мм | **0,72** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 55мм** | 1045PD55 | M-GREEN АГАР (Для виділення і підрахунку дріжджів/плісеней у воді методом мембранної фільтрації.) | Дріжджі/Плісені | 55 | мм | **0,80** | **0,67** |
| **Чашки Петрі 120мм** | 4003PD120 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 120 | мм | **1,22** | **1,14** |
| **Чашки Петрі 140мм** | 4006PD140 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР згідно з EUCAST (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 140 | мм | **1,10** | **1,03** |
| **Чашки Петрі 140мм** | 4002PD140 | МЮЛЕР ХІНТОН ІІ АГАР З 5% БАРАНЯЧОЇ КРОВІ (Для використання в аналізі чутливості до антимікробних препаратів методом дифузійного диска.) | Антибіотико резистентність | 140 | мм | **1,99** | **1,86** |
| **Чашки Петрі 60мм** | 1022PD60 | АГАР ДЛЯ ПСЕВДОМОНАД CN згідно з PN ISO 12780 а також PN-EN ISO 16266 | Pseudomonas aeruginosa | 60 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Чашки Петрі 60мм** | 8019PD60 | СЛАНЦ-БАРТЛІ АГАР ДЛЯ ЕНТЕРОКОКІВ згідно з PN ISO 7899-2 (Для виділення і підрахунку Ентерококків у воді методом мембранної фільтрації.) | Enterococcus | 60 | мм | **0,74** | **0,69** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Чашки Петрі 140мм** | 4008PD140 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) (для культивації широкого спектру мікроорганізмів) | Середовище збагачення | 140 | мм | **1,24** | **1,03** |
| **Чашки Петрі 120мм** | 4009PD120 | ТРИПТОНОВО-СОЄВИЙ АГАР (TSA) З ЛЕЦИТИНОМ & TWEEN 80 (Для ізоляції мікроорганізмів з дезінфікованих поверхонь з четвертичним сполуками амонію.) | Загальне мікробне забруднення | 120 | мм | **1,32** | **1,23** |
| **Чашки Петрі 60мм** | 1541PD60 | СОЛОДОВО-ДРІЖДЖЕВИЙ АГАР (YM) | Дріжджі/Плісені | 60 | мм | **0,83** | **0,69** |
| **Реактиви** | 6153TB2 | КИСЛОТА ФЕНІЛБОРОНОВА | реактиви | 2 | мл | **7,88** | **7,36** |
| **Реактиви** | 6155TB2 | ЕДТА | реактиви | 2 | мл | **7,88** | **7,36** |
| **Реактиви** | 6105TB9 | РОЗЧИН РІНГЕРА | реактиви | 9 | мл | **0,77** | **0,64** |
| **Реактиви** | 6152TB2 | СОЛІ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ | реактиви | 2 | мл | **10,50** | **9,81** |
| **Реактиви** | 3135BT100 | РЕАКТИВ КОВАЛЬСЬКОГО | реактиви | 100 | мл | **8,83** | **7,36** |
| **Реактиви** | 3130BT100 | РЕАКТИВ ЕЛЬРІХА | реактиви | 100 | мл | **10,96** | **9,13** |
| **Реактиви** | 3203BT500 | РОЗЧИН РІНГЕРА | реактиви | 500 | мл | **12,36** | **10,30** |
| **Реактиви** | 3225BT200 | TWEEN 80 | реактиви | 200 | мл | **47,09** | **39,24** |
| **Реактиви** | X075 | Яєчний жовток (емульсія) | суплемент | 100 | мл | **29,89** | **24,91** |
| **Реактиви** | X085 | Яєчний жовток(емульсія) з телуритом | суплемент | 100 | мл | **35,64** | **29,70** |
| **Реактиви** | G0038 | Суплемент для середовища PALCAM | суплемент | | мл | **90,84** | **75,70** |
| **Реактиви** | X193 | Поліміксин B | суплемент | | мл | **126,48** | **105,40** |
| **Реактиви** | 0220DM500 | ПЕПТОН ТРИПТОН | суплемент | 500 | г | **75,90** | **63,25** |

# ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

## Середовища у флаконах

**наявні пакування:**

- флакон 100 ml, 10 шт в упаковці
- флакон 200 ml, 10 шт в упаковці
- флакон 500 ml, 6 шт в упаковці

**Зберігання та термін придатності**

Більшість середовищ в пляшках слід зберігати при температурі 6 - 25 ° С.
Термін придатності для зберігання в пляшках: 12 місяців з дати виготовлення.
**Увага!** Весь вміст флакону слід використовувати відразу після відкриття! Не зберігати відкриту пляшку.

**Підготовка бутильованих середовищ для розливу на чашки Петрі**

1. Готові бутильовані агаризовані середовища мають бути розплавлені в апараті Коха при 80ºС або мікрохвильовій печі. Якщо ви використовуєте мікрохвильову піч для плавлення, поставте пляшку із середовищем у центр мікрохвильової печі.
2. Виберіть короткий час - зазвичай 5 -10 секунд (в залежності від об'єму середовища). Обережно злегка підігрійте флакон в мікрохвильовій печі та обережно привідкрийте кришку, щоб вирівняти тиск.
3. Поставте флакон у мікрохвильову піч та виберіть час (від 30 до 60 секунд). Протягом цього часу більшість середовищ розтопиться. Якщо необхідно, повторіть процедуру протягом 10-15 секунд, доки середовище не розтопиться. Якщо ви бачите часточки нерозплавленого агару, просто залишіть флакон при кімнатній температурі, Середовище розтопиться повністю саме. розігріте середовище має бути повільно охолоджене, доки не набуде оптимальної температури для розливу в чашки (45 – 50°С). Не охолоджуйте середовище різко. Згідно з EN ISO 7218: 2007 *"Мікробіологія продуктів харчування та тваринницьких продуктів. Загальні вимоги та керівництво для мікробіологічних досліджень"* допустимо розплавляти поживні середовища іншими приладами, включно з мікрохвильовками.

## Середовища в пробірках

**Наявні пакування:** 50 пробірок
Поживні середовища в пробірках - бульйони або скошені агари.

**Зберігання та термін придатності**

Середовища в пробірках мають зберігатись при 6 - 25ºС. Термін придатності для більшості середовищ в пробірках: 12 місяців з дати виготовлення.

**Обмеження щодо терміну придатності**

Наступні середовища мають термін дії **6 місяців**: Селенітовий F бульйон, бульйон та половинний бульйон Фразера, Мюлера-Кауфмана с новобиоцином та тетратионатом, Середовище з 10% лактози, бульйон Рапапорта-Василиадиса, Сабуро декстрозний агар з бензилпеніциліном та тетрацикліном, агар Вілсона-Блера, пептонова вода з лактозою.

## Середовища в чашках Петрі

**Доступні розміри чашок Петрі та пакування**

- Ø 90 mm, чашки, бічашки та три чашки; 10 шт в упаковці
- Ø 55, 120 і 150 mm; 5 шт в упаковці
- Count-tact чашки 10 шт в упаковці

**Зберігання та термін придатності**

Температура зберігання для готових до використання середовищ в чашках Петрі: 2 - 12ºС.
Термін придатності: зазвичай 3 місяці з дати виготовлення.

**Обмеження - термін закінчення строку придатності**
Середовища, що містять кров, та деякі, що містять антибіотики - 45-55 днів.
MRSA агар – 30 днів.
Вісмут Сульфіт агар – 21 днів.
**Увага:** Наступні середовища: Ендо агар, Ендо LES агар, Вісмут Сульфіт агар та хромогенні середовища особливо чутливі до світла!

### Діп-слайди – пластикові смужки, покриті з обох сторін транспортним і поживним середовищем.

**Наявні пакування:** 10 флаконів

**Зберігання та термін придатності**
Температура зберігання: 6 - 25ºС. Термін придатності: 6 до 9 місяців від дати виготовлення , в залежності від продукту.

### Культуральні бульони для крові та цереброспінальної рідини

**Наявні пакування:** 5, 15 і 50 мл флакони

**Зберігання та термін придатності**
Температура зберігання: 6 - 25ºС. Термін придатності: 12 місяців від дати виготовлення.

### Кров та сироватка

**Наявні пакування**
Дефібринована кров та сироватка наявна в об'ємах 100, 200 ml.

**Зберігання та термін придатності**
Кров: Температура зберігання 2 - 8ºС. Термін придатності: 21 день від дати виготовлення. Кінська сироватка повинна зберігатись у замороженому вигляді максимум один рік.
**Увага:** Весь вміст флакону слід використовувати відразу після відкриття!

# ЗАМОВЛЕННЯ

Ми раді прийняти замовлення електронною поштою. Просимо надати наступну інформацію під час замовлення:

- **Адреса доставки та дані контактної особи.**
- **Установчі документи**
- **Код продукту, назва та необхідна кількість.**

Будь ласка, направляйте всі замовлення на:

**e-mail: order@medcoswiss.com.ua**
**тел: +38 (067) 230 57 09**

Питання по продукції:

**e-mail: graso@medcoswiss.com.ua**
**тел: +38 (067) 21 78 750**



Palcam Agar, Ref. No 1502
*Listeria monocytogenes*

medcoswiss
Ukraine

**Уповноважений представник виробника**
**на території України ТОВ "Медкосвісс" (Україна)**
**79056, м.Львів, вул.Пластова 2**
**тел: +38 (067) 230 57 09**
**тел: +38 (067) 217 87 50**
e-mail: **graso@medcoswiss.com.ua**
**www.medcoswiss.com.ua**

**Адреса виробника:**
**GRASO Zenon Sobiecki, Krag 4A, 83-200 Starograd Gdanski, Польща**